

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

A kulcscsont és a lapockanyúlvány közötti ízület sérülései

Vállra eséskor részleges ficam jön létre az ízületben; ha súlyosabb a sérülés, a kulcscsont és a lapocka közötti szalagok is elszakadhatnak, így az ízület teljes ficam keletkezik.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A részleges ficam nem zavarja a váll működését; a fájdalom csillapodásáig a kart fel kell kötni, és pihentetni kell (általában egy hétig), majd gyógytornát végezni. Teljes ficam esetén a konzervatív kezelés nem eredményes.

Teljes ficam: az ízület fedett áttűzését a kulcscsont rögzítését végzik, a szakadt szalagokat közelítik, néha feltárás mellett varrattal egyesítik.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a fájdalom, ficam megszüntetése, mozgásképesség helyreállítása.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- Mint minden műtétnél, itt is fennáll a fertőzés veszélye, a behelyezett rögzítő drótok kicsúszása.
- Késői szövődmény lehet a kulcscsont és lapocka közötti ízület artrózisa (kopásos ízületi gyulladás mozgásbeszűküléssel) ezt általában konzervatívan lehet kezelni, nagy fájdalom esetén a kulcscsont külső végét eltávolítják.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Elvégezhető a ficam feltárása, a szalagok varrása és az ízület rögzítése feszítőhurok, ritkábban csavar segítségével. A csavar a kulcscsontot a lapocka hollócsőr nyúlványához rögzíti, 8 hét múlva el lehet távolítani.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

A végtag gyengesége maradhat vissza.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Teljes siker esetén a fájdalom megszűnik, a mozgásképesség helyreáll.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Általában 2-3 hét rögzítés szükséges, a mozgásképesség 6-8 hét után állhat helyre.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása