



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály
1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.
Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

Betegtájékoztató intravitreális gáz injekció beavatkozáshoz **(a beleegyező nyilatkozat .sz. melléklete)**

Tisztelt Betegünk!

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről. Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát.

Mi az intravitreális gáz injekció?

Szembe adott injekcióval expandáló (fokozatosan táguló) gázt juttatunk közvetlenül a megbetegedés helyére, az intravitreális térbe.

Lényege:

Az intravitreális gáz injekcióval az üvegtesti térbe fokozatosan táguló steril gázt tudunk eljuttatni. Ennek lényege, hogy a gáz az ideghártyát visszafekteti, visszanyomja alapjára és amíg fel nem szívódik, ott tartja. Ezáltal lehetővé teszi, hogy az ideghártya szakadását lézerrel körülzárjuk, hegesítsük. A fokozatos tágulás eredményeképpen kisebb mennyiségű gáz beadása is elegendő a kívánt hatás eléréséhez.

A beavatkozás menete:

A gáz injekció beadása steril körülmények között történik. Az injekció előtt a szemrésbe fertőtlenítő, érzéstelenítő és pupilla tágító cseppet kap, mely enyhe csípő érzéssel jár. Az injekció beadása néhány másodpercig tart. Közben tompa nyomást, feszülést érezhet. Ezt követően az orvos által meghatározott pozícióban kell elhelyezkedni és ezt megtartani akár napokig.

Milyen betegségeken lehet segíteni intravitreális injekcióval ?

Macula betegségek: az éleslátás területén kialakulhat folytonossági hiány(lyuk), vizenyő, vérzés.

Ideghártya leválás: az ideghártyán kialakult szakadás miatt folyadék jut az ideghártya alá, ami azt leemeli alapjáról.



**Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály**

1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

Szövődmények, mellékhatások és kezelésük:

Az intravitrealis injekciók adását követően enyhébb múltó panaszok a kezelés részeként is előfordulhatnak. Ilyenek: szemvörösség, vérzés a szúrás helyén, véraláfutás, duzzanat, diszkomfort érzés a szemben, könnyezés, viszketés, szűrő érzés. - Ezek nem igényelnek kezelést.

- allergiás reakció - szemcseppel, súlyosabb esetben általánosan adott gyógyszerrel gyógyítható
- gyulladás, ami lehet steril vagy fertőzőes - szemcseppel, súlyosabb esetben általánosan adott gyógyszerrel gyógyítható. Legsúlyosabb szövődmény a fertőzőes endophthalmitis, mely jellemzően néhány nappal a beavatkozás után alakul ki. Kockázata 0,02%. Azonnali műtéti beavatkozást igényel
- szaruhártya átmeneti vagy tartós elborulása - spontán gyógyul
- szemnyomás emelkedés közvetlenül a beavatkozás után - szemcseppel, súlyosabb esetben általánosan adott gyógyszerrel gyógyítható
- az ideghártya sérülése, szakadása, leválása - kezelése műtéti beavatkozást igényel

A lehetséges szövődmények listája minden beavatkozás esetén hosszú és a beteg számára ijesztő komplikációkat tartalmazó felsorolás. Ezek a szövődmények ritkák és ha fel is lépnek, gyakran nem súlyosak, megfelelő kezeléssel legyőzhetők. Lehetnek azonban súlyosak, életveszélyesek is, akár a látás vagy a szem elvesztését eredményezhetik, sőt ritkán halálhoz is vezetnek.

A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI

A beavatkozás előtti történések

A beavatkozás cseppestelenítésben történik.

A beavatkozás utáni történések

A beavatkozás után a beteg gyulladásgátló és antibiotikum tartalmú szemcseppeket kap, amelyeket a beavatkozást végző orvos utasításai szerint kell használnia.

FONTOS!

A szemet nem szabad megnyomni, és megdörzsölni!

Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal menjen a műtétet végző intézménybe, ha a következőket észleli:

- Erős fájdalom
- Látásromlás
- A szem fokozódó vörössége

Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények

A műtét után tartózkodjék az erős fizikai terheléstől, ne menjen uszodába, szaunába. Az első napok során fokozottan ügyeljen arra, hogy víz, sampon, szappan se kerüljön az operált szemébe. Az előírt szemcseppeket az orvos utasításai szerint kell használnia. Szemészeti ellenőrző vizsgálatra a kezelést végző szemorvos utasításának megfelelően kell elmenni. Kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek során nagy annak a veszélye, hogy ütés, sérülés éri a szemét. Számítson arra, hogy a gyógyulás lassú, a várható legjobb eredmény elérése is hónapokig tarthat.



**Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010610700 Szemészeti Osztály**

1125 Budapest, Diós árok 1-3.



Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI
Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges előnyeitől elesik.

Alulírott a fentieket tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét alatti és utáni szövődményekről ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett beavatkozást módosítani illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségről a kezelőorvosomat tájékoztattam. Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot az injekció beadása előtt bármikor visszavonhatom.

Mindezek alapján a fenti beavatkozásba beleegyezem.

.....