



**Észak-Közép-budai Centrum  
Új Szent János Kórház és Szakrendelő  
010610700 Szemészeti Osztály**

1125 Budapest, Diós árok 1-3.



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

**Betegtájékoztató ideghártya leválás elleni bedomborító műtétről**  
**(a beleegyező nyilatkozat .sz. melléklete)**

Tisztelt Betegünk!

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről. Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát.

**Mi a sclera(ínhártya) bedomborítás?**

Az ideghártya leválás egyik lehetséges műtéti megoldása, mely során a szemgolyó külső falának benyomásával fektetjük vissza alapjára a levált ideghártyát.

Lényege:

A műtét során a szemgolyót fedő kötőhártyát lefejtjük és az egyenes szemizmok alatt vezetve az ínhártyára varrattal rögzítünk egy idegen anyagot (pl. szilicon vagy szivacs szalagot), melyet megszorítunk. Ezáltal a szemgolyó falát bedomborítjuk és közelítjük a levált ideghártyához. Ezt követően kívülről, az ínhártya felől az ideghártya alatti folyadékot lebocsájtjuk, majd az ideghártyát fagyasztással és/vagy lézerrel rögzítjük alapjához. A leválasztott kötőhártyát visszahelyezzük és varrattal rögzítjük. Kiegészítésként szükség lehet az üvegtestbe gáznemű anyagot juttatni az ideghártya biztosabb rögzítéséhez.

Milyen betegségen lehet segíteni a sclera bedomborítással?

*Ideghártya leválás:* az ideghártyán kialakult szakadás miatt folyadék jut az ideghártya alá, ami azt leemeli alapjáról.

Szövődmények:

- a szemhéj duzzadt, véraláfutásos lehet.
- a helyi érzéstelenítő injekció után : allergiás reakció, szemgödri vérömleny, a szemgolyó és/vagy a látóideg sérülése.
- gyulladás, ami lehet steril vagy fertőzős.
- varratelégtelenség ill. kilökődés
- a bedomborító idegen anyag kilökődése
- szemnyomás emelkedés közvetlenül a műtét után, de évekkel később is jelentkezhet
- szemizmok sérülése, kettőslátás
- a szemgolyó perforációja



# Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő 010610700 Szemészeti Osztály

1125 Budapest, Diós árok 1-3.



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

Sajnos az anatómiai gyógyulás nem jár minden esetben együtt a látás javulásával. A műtéttel nem lehet minden esetben a kívánt anatómiai és/vagy működésbeli eredményt elérni. Szükség lehet további lézeres vagy műtéti beavatkozásra is.

A lehetséges szövődmények listája minden beavatkozás esetén hosszú és a beteg számára ijesztő komplikációkat tartalmazó felsorolás. Ezek a szövődmények ritkák és ha fel is lépnek, gyakran nem súlyosak, megfelelő kezeléssel legyőzhetőek. Lehetnek azonban súlyosak, életveszélyesek is, akár a látás vagy a szem elvesztését eredményezhetik, sőt ritkán halálhoz is vezetnek.

## A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI

### 5.1. A beavatkozás előtti történések

A beavatkozás

- vezetési (a szem mellé adott injekcióval történő) érzéstelenítésben,
- altatásban történik.

Mindkét esetben a beavatkozás előtt érzéstelenítő szemcseppeket is fog kapni. Amennyiben a beavatkozás altatásban történik, úgy az altatóorvos az altatás módjáról és annak esetleges szövődményeiről tájékoztatni fogja.

Az érzéstelenítő injekciót előzetes csepp érzéstelenítés és Betadinos fertőtlenítés után bőrön vagy kötőhártyán keresztül juttatjuk a szegély köré és/vagy mögé. Ezt követően okulopressziót végzünk, mely lehetővé teszi az injekció teljesebb eloszlását és megszünteti a beadást követő feszülést.

### 5.2. A beavatkozás utáni történések

A beavatkozás után a beteg gyulladásgátló és antibiotikum tartalmú szemcseppeket kap, amelyeket a beavatkozást végző orvos utasításai szerint kell használnia, várhatóan heteken a műtét után. Egyes esetekben a beteg a kötőhártya alá gyulladáscsökkentő injekciót is kap.

## FONTOS!

A szemet nem szabad megnyomni, és megdörzsölni!

Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal menjen a műtétet végző intézménybe, ha a következőket észleli:

- Erős fájdalom
- Látásromlás
- A szem fokozódó vörössége

### 5.3. Életmódbeli változások a beavatkozás után, várható következmények

A műtét után tartózkodjék az erős fizikai terheléstől, ne menjen uszodába, szaunába. Az első hetek során fokozottan ügyeljen arra, hogy víz, sampon, szappan se kerüljön az operált szemébe. Az előírt szemcseppeket az orvos utasításai szerint kell használnia, előreláthatóan heteken, hónapokon át. Szemészeti ellenőrző vizsgálatra a kezelést végző szemorvos utasításának megfelelően kell elmenni. Kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek során nagy annak a veszélye, hogy ütés, sérülés éri a szemét. Uszodalátogatás ugyancsak akár évekig tiltott.



**Észak-Közép-budai Centrum  
Új Szent János Kórház és Szakrendelő  
010610700 Szemészeti Osztály**

**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

**A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI,  
KOCKÁZATAI**

Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges előnyeitől eszik.

**BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES  
ELŐNYEI, KOCKÁZATAI**

Azokban az állapotokban, amikor egy szembetegség miatt már ez a műtét válik indokolttá, más, bizonyítottan hatásos beavatkozás csak elvétve jöhet szóba.

Alulírott a fentieket tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét alatti és utáni szövődményekről ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett beavatkozást módosítani illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségről a kezelőorvosomat tájékoztattam. Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom.

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem.

.....