

## MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....  
Születési dátuma: .....

Tájékoztatást adó orvos neve: .....

### **Vérgyülem eltávolítása a mellkas feltárásával**

Tompa, vagy áthatoló mellkasi sérülés hatására mellúri vérgyülem alakulhat ki, mely nem kellő eredményességgel és kellő időben történt szívó-kezelés esetén megalvad, a tüdőt összenyomva légzési nehezítettséget okozhat.

#### **1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:**

Műtét előtt röntgen, illetve CT vizsgálatot végzünk. A feltárás, altatásban történik a sérülés oldalán. A mellüreget megnyitva az alvadt vérgyülem eltávolítható mind a tüdő felszínéről, mind a mellkasfali mellhártyáról. A műtét végén szívócsöveket helyezünk be.

#### **2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:**

Terápiás eljárás, amely célja a tüdő tágulását akadályozó véralvadék eltávolítása.

#### **3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:**

Kialakulhat mellhártyagyulladás, melynek gyógyítása elhúzódó kezelést, öblítő-csővezést igényelhet. Mint minden műtétnél, itt is fennáll a sebfertőzés veszélye.

*Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.*

*A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!*

#### **4. Alternatívák ismertetése:**

Egyéb kezelési lehetőség nincs, az alvadt vérgyülem eltávolításának egyedüli módja a műtét.

#### **5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:**

A csökkent légzőfelszín a vérkeringés fokozatos romlásához, vagy mellhártyakéreg, un. callus kialakulásához vezethet, újabb szövődményeket okozva.

#### **6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:**

A vérgyülem eltávolítása után a tüdő kitér, a légzési panaszok, ha korábban nem voltak, teljes egészében megszűnnek.

#### **7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:**

A műtét alatt behelyezett szívócsövek eltávolítása után (3–4 nap) a beteg felkelhet, 7–10 nap után otthonába bocsátható. Rendszeresen végzett légzőtornát követően egy hónappal később korábbi tevékenységét folytathatja.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása