



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő SEBÉSZETI OSZTÁLY

a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. med. habil István Gábor Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458- Internet: www.janoskorhaz.hu

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatást adó orvos neve:

VÉGTAG CSONKOLÁS (AMPUTÁCIÓ)

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságra alapuló döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót. Az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

A szövetek vérellátási zavara a végtagokon oxigén hiányos állapotot idéz elő, ami elhaláshoz vezet. Oka legtöbbször az érszűkület és a cukorbetegség. Az alsó végtagokon gyakori, de ritkán a felső végtagokon is előfordulhat. Az elhalás érintheti a lábujjakat, de magasabbra, akár a comb szintjéig is terjedhet. Általában súlyos fájdalommal jár, de cukorbetegség esetén akár fájdalom nélkül is kialakulhat.

Nedves elhalás esetén gyulladós jelek, bőrpír, duzzanat, láz a jellemző tünetek, később a bőr barnás-feketésen elszíneződik. Ez sürgős, akár életmentő beavatkozást tesz szükségessé a fenyegető vérmérgezés miatt.

Száraz elhalás esetén a lábujjal gyulladós tünetek nélkül feketésen elszíneződnek, „elszáradnak”. A műtét itt is elkereülhetetlen és a későbbi fertőződés, vérmérgezés megelőzésére mielőbb elvégzendő.

A vizsgálatok során az Ön esetében ezen állapotok egyike alakult ki, ezért elkerülhetlenné vált egy csonkító műtét (amputáció) elvégzése. Amennyiben csak a lábujjakra vagy a láb boka alatti része érintett elégséges lehet a lábujjak illetve a lábközép csontok magasságáig terjedő beavatkozásra. Ha az elhalás a lábszár alsó-középső harmad határig terjed, lábszár szintű amputáció szükséges. Ha a keringészavar vagy a gyulladós folyamat magasabb szintre terjed, csak a comb szintű amputáció az, ami a beteg életét meg tudja menteni.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

A végtag elhalt részének eltávolítása, amivel a beteg élete megmenthető.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A lábszár és a comb szintű amputáció magas kockázatú beavatkozás, miután az alapbetegségen kívül számos egyéb kóros betegség is rontja a gyógyulás esélyét. A végtag elhalása csonkolás nélkül a különböző szepsziszis szövődmények (veseelégtelenség, májelégtelenség, vérszegénység légzőszervi zavarok) miatt előbb utóbb halálhoz vezetnek.

Szövegmények:

- Sebgyógyulási zavar. A lábujj vagy a láb szintjén elvégzett műtétek után a sebet nyitva kezeljük, akár hetekig is szükséges rendszeres kötözése, kezelése. A lábszár és a comb amputációk után a sebet zárjuk, de nem ritkán sebgyógyulási zavar (sebfertőzés, váladékozás, sebszétválás) alakul ki. Ennek oka egyrészt az eleve fertőzött környezet, a másrészt az alapbetegség, a keringésszavar és cukorbetegség, ami a sebgyógyulást nehezítheti.

-Vérzés. Mint minden műtét után ezen beavatkozások esetében is előfordulhat kisebb utóvérzés, ami nyomókötéssel kezelhető. A lábszár és a comb amputáció esetében ritkán nagyobb utóvérzés alakulhat ki a lekötött főbb artériákból, vagy vénákból, ami ismételt feltárást és a vérző ércsonk ellátását igényli.

-Amennyiben fekvőbeteg esetében történik amputáció és a mobilizálás, ágyból kikeltés nem kivitelezhető, úgy felfekvés alakulhat ki, vagy pangásos tüdőgyulladás jelentkezik, ami akár a beteg halálához is vezethet.

- Előfordul, hogy a gyulladós folyamat a csonkolás ellenére tovább halad a végtagon a törzs irányába. Ilyenkor életmentő céllal újabb, magasabb szinten történő ismételt amputáció válhat szükségessé.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövegmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, esetenként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Amennyiben végleges / definitív / végtagelhalás alakul ki, az amputáció az egyetlen, a beteg gyógyulásának esélyét megeremtő t beavatkozás.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

A szükséges amputáció elhagyása vagy késleltetése esetén a keringési zavar miatt kialakult gyulladós folyamatok a végtag felsőbb részeire is ráterjedhetnek, és emiatt egyre kiterjedtebb, lábszár vagy comb amputációra is kényszerülhetünk. Az érintett lábujj vagy lábujjak időben történő csonkolása helyett néhány nap múlva már csak a comb csonkolása lehet életmentő. Az amputáció elutasítása vérmérgezéshez, az életfontos szervek működési elégtelenségéhez, végül halálhoz vezet.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A siker az amputációk esetén a beteg életének megmentését és a végtag minél teljesebb megőrzését jelenti. Ha mérlegeljük azt, hogy a lábujj amputációk után speciális ortopéd cipő viselésével teljes életet élhet a beteg, akkor sikeresnek kell mondanunk a beavatkozást. A lábszár és a comb amputációk esetében pedig szintén a mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek és a gyógyászati segédeszköz készítőik segítségével, megfelelő művégtagok alkalmazásával, a beteg a mozgásképességét visszanyerheti, Ez minden esetben erős akaratot és megfelelő fizikai erőnlétet feltételez..

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A gyógyulás minden esetben hosszadalmas, nagy türelmet igényel mind a beteg, mind az ellátásban

résztevők részéről. A beteg a műtét után sok segítségre szorul, nagy szükség van a család bevonására is. A házi betegápolásban igénybe vehető a házi orvos által delegált gyógytornász. .

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása