

# MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

## Könyökficam

Kinyújtott kézre esés könyökficamot okozhat. Ha nincs társult törés vagy többszörös szalagsérülés a helyretétel után, a könyökízület általában stabil, és a ficam ismétlődése nem valószínű.

### 1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Egyszerű ficam: A helyretétel általános, vagy helyi érzéstelenítésben történik. A helyretétel után megvizsgálják, a könyökízület stabil-e. Ellenőrzik a keringést és beidegzést, majd rtg felvételt készítenek, hogy eldöntsék, a ficam helyretétele sikeres volt-e, és nincsenek-e társult törések. A kart derékszögű gipszsínnel rögzítik egy hétig.

Töréses ficam: a ficamhoz a könyökcsúcs vagy a felkar, illetve az alkarcsontok könyökízületi végének törései társulhatnak szalagsérüléssel, ilyenkor sok esetben műtét feltárás és belső rögzítés (lemezes, csavaros) szükséges az ízület ideiglenes rögzítésével - áttűzéssel. A tűződrótokat három hét után eltávolítják.

### 2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a ficam helyretétele, a normális anatómia és könyökműködés helyreállítása.

### 3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A ficam során a felkari verőér sérülhet. Ilyenkor érfestéses vizsgálat (arteriográfia), a felkar verőérének feltárása műtéti helyreállítása szükséges. A középideg vagy a singcsonti ideg is sérülhet. A funkció kiesése általában átmeneti, és 6-8 hét alatt rendeződik.

A kóros helyen képződő csontosodás a roncsolt lágyrészekben keletkezik. A rtg felvétel már a sérülést követő 4.-6. héten a lágyrészek elcsontosodását mutathatja. Ha felmerül a szövődmény gyanúja, a tornagyakorlatokat felfüggesztik, és a könyökízületet rögzítik a fájdalom csillapodásáig, majd óvatosan újra el lehet kezdeni a tornát. A gyulladáscsökkentő gyógyszerek segíthetik a merevség csökkentését; ezeket néha megelőzés céljából is használják. A mozgásokat gátló csontos kinövések műtéti eltávolítása is lehetséges.

A másodlagos ízületi kopás (artrózis) késői szövődmény. A tünetek sokszor konzervatíván kezelhetők, de a fájdalom és a mozgások beszűkülésének fokozódása esetén a könyök ízület műtéti elmerevítése, ritkább esetben könyökízületi protézis beültetése szóba jöhet.

*Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.*

*A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!*

**4. Alternatívák ismertetése:**

Nem áll rendelkezésre.

**5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:**

Kezeletlenül a ficam nem gyógyul, súlyos torzulás, mozgáskorlátozottság jön létre. A társult törések ellátása a teljes funkció helyreállítása miatt szükséges.

**6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:**

A sérülés súlyosságától függően gyakori a könyökízület mozgásában 20-30 fokos elmaradás. A fizioterápiával, tornával az eredmény javítható.

**7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:**

Egyszerű ficam esetén egy hét múlva a gipszsínt el lehet távolítani és óvatos tornagyakorlatokat lehet kezdeni, majd 3 hét múlva a karfelkötést is el lehet hagyni. A teljes mozgásterjedelem 6-8 hét múlva áll helyre.

Töréses ficam: a gipszrögzítés 3 hétig szükséges. A gipszlevétel után tornakezelést kezdenek, melyet 8-12 hétig kell végezni.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása