

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:
Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Lépsérülés ellátása

Leggyakrabban a bal mellkasfélen az alsó bordák magasságában, vagy a has bal oldalának felső részén történt tompa, vagy áthatoló sérülés következtében sérülhet a lép is. A lép finom tok veszi körül, melynek szakadása mindig vérzéshez vezet, melynek erőssége a lépsérülés nagyságától függ.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Lépsérülés gyanúja esetén hasi ultrahang vizsgálat, esetleg CT vizsgálat történik. Ha a lép körül vagy a hasüregben vér van, azonnal műtétet végzünk. A lép kapujában lévő ereket lekötjük, majd átvágjuk. A lép helyére és a hasüreg legmélyebb pontjára csövet helyezünk az ott meggyült váladék, esetleges utóvérzés kivezetésére. A csövek a 4 – 5 nap múlva távolítjuk el.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Terápiás eljárás, amely életmentő beavatkozás.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A hasnyálmirigy farki részének sérülése, mely a leggondosabb műtéti technika mellett is bekövetkezhet. Ez a műtét utáni időszakban lázas állapothoz vezethet, hasnyálmirigysipoly, esetleg tályog alakulhat ki. A sipoly gyógyulása hosszú, türelmet igénylő folyamat, míg a fertőzött tályog újabb műtéti beavatkozást tesz szükségessé. Mellkasi szövődmények bal oldali mellhártyagyulladás, illetve tüdőgyulladás lehetnek. Mint minden műtétnél a sebfertőzés esélye itt is fenn áll.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

A lép megtartása, megkísérelhető, ha a lép szakadása felszínes, a vérzés szivárgó jellegű. Speciális ragasztó csíkkal, vagy finom öltésekkel, esetleg elektromos késsel a vérzés megállítható. Ilyen beavatkozás után a beteget szorosan megfigyeljük, mert a vérzés megismétlődhet. Ez esetben újabb műtét válik szükségessé, melynek során a lép eltávolításra kerül.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Igen ritkán a lép körüli vérömleny miatt a vérzés megáll, és a beteg spontán gyógyul, azonban a lépsérülés műtéti megoldást igényel az elvérzés veszélye miatt.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Ha szövődmény nem lép fel, teljes gyógyulás várható. Azonban mivel a lép a vérkeringésbe jutott kórokozók elpusztításában fontos szerepet játszik, eltávolítása felnőtteknél krónikus, vagy visszatérő fertőzésekhez vezethet. Emiatt Pneumococcus és Meningococcus elleni védőoltás beadása szükséges.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtét utáni napon a sérült folyadékot fogyaszthat, a bélműködés megindulását követően pedig táplálható. Egy hét után a beteg hazaengedhető, további négy hét múlva korábbi tevékenységét folytathatja.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása