

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:
Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Májsérülés

A hasüreg felső részét érő tompa, vagy áthatoló sérülés okozhat különböző nagyságú, és mélységű repedéseket, szakadásokat a máj szövetében, mely vérzéssel jár. A nagyobb epeutak, vagy az epehólyag sérülése epefolyáshoz, az epevezetékbe kerülő vér pedig az epevezeték elzárja, és sárgaságot okoz.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A kivizsgáláshoz nélkülözhetetlen a hasi ultrahang, vagy CT vizsgálat. A műtét során a felületesebb szakadásokat külön erre a célra kifejlesztett májvarró készlettel elvarrjuk, a mélyebb sérülések miatt részleges májszövet-, ritkán májlebeny eltávolítást végzünk.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a sérülés ellátásával a vérvesztés megállítása és az emiatt kialakuló shock, esetleges halál elhárítása.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A májszövet törékeny, igen vérzékeny, ezért különösen fontos a lehető legpontosabb vérzéscsillapítás és az epecsorgás megszüntetése. Ha a vérzés nem csillapítható teljesen, a sérült részt gézcsíkokkal kitömjük, majd 3 – 4 nappal később, amikor a vérzés megszűnt követően újabb műtéttel eltávolítjuk. A sérült epehólyagot mindig eltávolítjuk. Utóvérzések miatt nem ritka az újabb feltárás. A műtét utáni szakban gyakran elhúzódó lázas állapot észlelhető, mely antibiotikus kezelést igényel. Mint minden műtét esetén, itt is fennáll a sebfertőzés veszélye.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Májsérülés esetén a műtét nem kerülhető el. A mély és erősen vérző repedések esetében a máj steril, a műtéteknél használt szövetkendővel végzett szoros beborítása lehetséges, amit két-három nap után újabb feltárásból távolítjuk el a leszorító kendőt. Ezzel az eljárással a májszövet esetleges részleges eltávolítása kerülhető el.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Kezeletlenül a folyamatosan vérző májsérülés elvérzéshez, halálhoz vezet.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Sikeres vérzéscsillapítás – elvarrás, tamponálás, vagy leszorítás útján – teljes májszövet regenerálódáshoz, gyógyuláshoz vezet.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A beteg a műtétet követően több napig csak folyadékot fogyaszthat, majd pépes, később szilárd táplálék adható. Szövődmény nélküli esetekben 8 – 10 nap után a beteg otthonába bocsátható, 4 – 6 hét múlva korábbi tevékenységét folytathatja.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása