

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Lábközépcsont törések

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A sorozat lábközépcsont törés, illetve az I-es, illetve az V-ös lábközépcsont törése esetén fedett, vagy feltárással végzett helyzetétele és rögzítése dróttűzéssel vagy kis lemezzel és csavarokkal vagy a velőürsínézéssel lehetséges. Az V. lábközépcsont alapjának elmozdulással járó szakításos törését műtéti úton csavarral, vagy feszítőhurokkal rögzítik.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a lábboltozat pontos helyreállítása.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Mint minden műtétnél, itt is előfordulhat fertőzőes szövődmény. Az alsó végtagi műtétek és az alsó végtagok tartós külső rögzítése a vérrögképződést (vénás trombózis) és a vérrög tüdőérbe ékelődésének (tüdőembólia) esélyét megnövelik, emiatt orvosa véralvadásgátló kezelést fog javasolni.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Az elmozdulás nélküli I, V lábközépcsont törések és a II-III-IV lábközépcsontok törései gipszrögzítéssel is kezelhetők.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Lábfájdalom, torzulás, járási nehézség alakul ki.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Teljes gyógyulás érhető el.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Gyógyulás, utókezelés: konzervatív kezelés: a duzzanat megszűnte után a lábboltozatra modellált járógipszet helyeznek fel, amelyet 3-6 hétig visel a beteg. Gipszlevétel után 3-4 hét tornakezelés szükséges.

Műtéti kezelés: varratszedés után körkörös gipszrögzítést helyeznek fel, 3 hét tehermentesítés után további 3 hétig járógipszet visel a beteg, majd gipszlevétel után 6-8 heti tornakezelés szükséges.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása