

# MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

## Artroszkópia

Az artroszkópia (az ízületek tükrözéses vizsgálata) a leggyakrabban alkalmazott, és a térsérülések diagnosztizálásának és kezelésének igen fontos eszköze. A módszer gyors, a beteg számára kis megterhelést jelentő beavatkozás, melyet egyre gyakrabban végeznek rövid kórházi benntartózkodás során.

### **1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:**

Néhány kicsiny metszésen keresztül az orvos bevezeti a műszer – száloptikás kamera –ceruza vastagságú optikai részét a térdízületbe, és monitoron megtekinti, és ha lehetséges, további egy, vagy több apró nyíláson keresztül bevezetett eszköz segítségével ellátja a sérült részeket.

### **2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:**

Terápiás eljárás, amely célja az ízületben kialakult panasz okának kiderítése és amennyiben lehetséges megoldása.

(A leggyakoribb térdízületi problémák: gyulladás, a meniszkusz (holdas porc) sérülései, szalagok szakadása, az ízületi felszínek kopásos elváltozása és a térdkalács betegségei (ficam, rendellenes elhelyezkedés.))

### **3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:**

- Ízületi bevérzés: a műtét után az operált ízület beduzzadhat, feszessé válhat. Nyomókötéssel, hűtéssel eredményesen kezelhető. Ritkán szükséges az ízület feltárása, drain behelyezése, a vérzés forrásának megszüntetése.
- Fertőzés: műtét során igen ritkán, de előfordulhat, hogy a sebbe kórokozók kerülnek. Ez artroszkópia esetén ritkán fordul elő. A fertőzés jele a műtét után 2-7 napon jelentkező magas láz, ízületi duzzanat. Gennyes gyulladás esetén azonnali beavatkozás, az ízület átmosása szükséges.
- Visszérgyulladás, trombózis: Elsősorban túlsúlyos, vagy visszértágulatban szenvedő betegeknél fordul elő. Ilyenkor a lábszár, comb megduzzad, fájdalmassá válik. A szövődmény megelőzése érdekében minden végtagműtét esetén a beteg véralvadást gátló injekciót kap, melyet kezelő orvosa által meghatározott ideig naponta megfelelő betanítás után saját magának kell beadnia.

*Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.*

*A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!*

**4. Alternatívák ismertetése:**

Néha a tervezett beavatkozás csak a térdízület megnyitásával végezhető el.

**5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:**

Kezeletlenül a panaszok fokozódhatnak.

**6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:**

A talált elváltozástól függ.

**7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:**

A beteg a műtét után rugalmas pólyával felkelhet, térdtornát kell végeznie, és mankóval járhat. A terhelés engedélyezése a talált lelettől, és az elvégzett beavatkozás jellegétől függ. A térdízületbe helyezett csövet a műtét utáni napon eltávolítják, a beteg otthonába távozhat. A varratokat 7-10 nap után lehet eltávolítani. Műtét után 4-6 hét gyógytorna szükséges.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

**NYILATKOZAT**

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása