



**Észak-Közép-budai Centrum  
Új Szent János Kórház és Szakrendelő  
010610700 Szemészeti Osztály  
1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**  
Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

**Betegtájékoztató iridotomia műtétről  
(a beleegyező nyilatkozat .sz. melléklete)**

Tisztelt Betegünk!

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről. Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a műtétet. A műtét előtt alá kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a műtét alatt és után.

Ha bármilyen kérdése van, kérdezze meg kezelőorvosát.

**1./ A BETEGSÉG MEGNEVEZÉSE, ISMERTETÉSE**

**ELZÁRÓDOTT VAGY SZŰK CSARNOKZUG**

Amennyiben a csarnokzug elzáródik, akkor a szemfolyadék (csarnokvíz) keringése leáll. A sugártest által termelt csarnokvíz a szemben felhalmozódik, és extrém magas értékre emelkedik a szem belnyomása. Amennyiben szűk, alig nyitott csarnokzugot találunk vizsgálat során, úgy nagy a kockázata annak, hogy a csarnokzug később elzáródhat. A zöldhályog betegségek egy részénél ez a probléma áll fenn. (lásd glaucoma tájékoztató).

**2./ A BEAVATKOZÁS JELLEGE, ISMERTETÉSE**

A lézerkezelés során, a szivárványhártya széli részén egy vagy több nyílást készítünk lézer segítségével.

**3./ A BEAVATKOZÁS CÉLJA**

A lézerkezelés célja, hogy a szem belsejében a szivárványhártya előtti és mögötti tér nyomásviszonyát kiegyenlítsük, és az elzáródott csarnokzug ismételen megnyíljon. A csarnokzug megnyílása esetén a csarnokvíz elvezetése normalizálódik, a szemnyomás emelkedés megszűnik. Amennyiben szűk, alig nyitott csarnokzugot találunk, megelőző céllal végezzük el a fenti beavatkozást.



**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010610700 Szemészeti Osztály**  
**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

#### **4./ A BEAVATKOZÁS LEHETSÉGES KOCKÁZATAI**

##### **4.1. A beavatkozás közben fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények**

A kezelést átmeneti szemnyomásemelkedés, steril szivárványhártya gyulladás és átmeneti irritáció érzés kísérheti, ezért a lézerkezelést követő napokban fokozott ellenőrzés és kiegészítő szemészeti kezelés (gyulladás- és szemnyomás csökkentő szemcsepp használata) szükséges. A lézeres kezelés után a látás néhány órán át homályos a beavatkozáshoz szükséges pupillaszűkítés és a kontaktlencséhez alkalmazott sűrű folyadék miatt.

##### **4.2. A beavatkozás után fellépő lehetséges következmények, illetőleg esetleges szövődmények**

A beavatkozást követően a szemnyomás esetenként nem normalizálódik, vagy újra megemelkedhet, ezért a beavatkozást követően többszöri szemnyomás ellenőrzés javasolt. Amennyiben a szemnyomás nem normalizálódik, úgy a lézerkezelés kiegészítése, vagy más - a szemnyomás csökkentésére szolgáló - beavatkozás válhat szükségessé.

#### **5./ A BEAVATKOZÁS KÖRÜLI IDŐSZAK JELLEMZŐI**

##### **5.1. A beavatkozás előtti történések**

A beavatkozás előtt szemnyomás csökkentő, pupillaszűkítő és érzéstelenítő szemcseppeket fog kapni. Amennyiben a pupilla nem megfelelő mértékben szűkíthető be, szoros ellenőrzés mellett a beavatkozás későbbi időpontra halasztható.

##### **5.2. A beavatkozás utáni történések**

A beavatkozás után gyulladáscsökkentő és esetlegesen további szemnyomás csökkentő gyógyszert és szemcseppet kell használni. A beavatkozás utáni napokban a szemnyomás többszöri ellenőrzése javasolt. A szemet nem szabad megdörzsölni! Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal menjen a műtétet végző intézménybe, ha a következőket észleli:

- Erős fájdalom
- Látásromlás
- A szem fokozódó vörössége

#### **6./ A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI**

Amennyiben a kezelés elmarad, a kezelés kockázatait ugyan elkerüli, de a magas szemnyomás továbbra is kifejti károsító hatását. A hosszú ideig fennálló emelkedett szemnyomás - a szemfájdalom, fejfájás, hányinger és rossz közérzet mellett - a látóidegrostok pusztulásához és a látás fokozatos romlásához, esetleges elvesztéséhez vezethet.



**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010610700 Szemészeti Osztály**  
**1125 Budapest, Diós árok 1-3.**



**Osztályvezető : Dr. Gombos Katalin PhD.**

Telefon: 458-4500, Fax: 458-4656, Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

**7./ A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI**

Amennyiben valamely okból a fenti lézeres beavatkozás nem végezhető el, akkor a szivárványhártyán nyílás készíthető egy, a szem belsejében végzet műtéttel. Ennek a beavatkozásnak a lehetséges előnyeiről és hátrányairól egy másik betegtájékoztatónkban olvashat.

Alulírott a fentiek tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét alatti és utáni szövődményekről ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett beavatkozást módosítani illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségről a kezelőorvosomat tájékoztattam. Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom.

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem.

.....