

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:
Születési dátuma:

Tájékoztatást adó orvos neve:

Az orsócsont fejének törései

Az orsócsont fején vésőtörés, ritkábban peremtörés, néha darabos törés jöhet létre. A benyomódással járó törések speciális felvételeken láthatók.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:
Elmozdulás nélküli törés konzervatívan kezelhető. A könyökízületi vérömlenyt leszívják, rugalmas pólyát, vagy rövid ideig (7-10 nap) gipszrögzítést helyeznek fel.

Elmozdulással járó töréseket esetén a törést feltárják, helyreteszik és kis csavarokkal rögzítik a letört darabot. A darabos törések miatt az orsócsont fejét néha el kell távolítani. Ha a töréshez könyökficam társult, megkísérlik az orsócsont fejének pontos helyreállítását. Ha ez nem lehetséges, a könyökízületet a ficamodás veszélye miatt áttűzik, és 3 hétig gipszsinben rögzítik, Protézis beültetése is lehetséges.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Terápiás eljárás, amely célja könyökízület mozgásainak teljes helyreállítása

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Mint minden műtétnél, itt is előfordulhat fertőzés és vérömleny képződés.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Egyéb kezelési lehetőség nincs.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Elmozdulással járó törések esetén ízületkopás (artrózis) alakul ki, mely az orsócsont fejének eltávolítását teheti szükségessé.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A törés általában meggyógyul, azonban a könyökízület, illetve a csuklótáji orsó- és singcsont közötti ízület merevsége gyakori. A könyökficam ismétlődhet, ha a könyök belső oldalszalagja is sérült és az orsócsont fejét eltávolították.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Az elmozdulás nélküli törés esetén korán 3-4 hétig tornakezelést kezdenek; a könyököt aktívan hajlítani, nyújtani és az alkart forgatni lehet. Az elmozdulással járó törések, darabos törések rögzítési ideje legfeljebb 3 hét, de néha 8-10 hét utókezelés is szükséges lehet.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása