

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Rekeszizom sérülés

A baloldali rekeszizom szakadásán keresztül hasúri szervek türemkedhetnek részlegesen, vagy teljesen a bal mellüregbe. Ez az állapot nem csak a keringést és légzést rontja a szív és tüdő nyomatása által, hanem a mellüregbe került szervek vérellátásának zavarához is vezethet. A gyomor, vagy bélfal elhal, ezen keresztül kórokozók, gyomor- vagy béltartalom jut a mellüregbe, mely életveszélyes gyulladás forrása.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Előzetes mellkasi és nyelési röntgen, szükség esetén endoszkópos vizsgálat segítik a rekeszsérülés kórismézését. A biztonságos megoldás a mellkas és has egyidejű megnyitása. A műtét során a hasi szerveket visszahelyezzük, ha falukon elhalás van, kimetsszük, majd a rekeszizom sérülését elvarrjuk. A műtét végén a mellüregbe és a hasüregbe csöveket helyezünk be 3-4 napig.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a mell –és hasüreg közötti élettani „határ” helyreállítása, mely mind a mellkasi, mind a hasi szervek normális működésének alapfeltétele.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Lehet a mindkét testüregben egyszerre, vagy csak a mellkasban, illetve a hasüregben fellépő gyulladás, mely életveszélyes állapot lehet, kezelése elhúzódó mellkasi öblítő-csővezés, illetve ismételt hasi feltárást tehet szükségessé. Mint minden műtét esetén a sebfertőzés ebben az esetben is előfordulhat.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

A kezelés műtéttel lehetséges. A rekeszsérülés, ha nem nagy kiterjedésű, ellátható mellkasi, illetve hasi feltárásból egyaránt. A hasüreg felől nehezebb a rekeszizom szakadásának elvarrása, a mellkas felőli varrat a rekesz közelsége miatt könnyebben végezhető el.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Kezeletlenül a rekesz szakadása a hasi nyomásfokozódás miatt növekedhet, a mellkasba türemkedő szervek falának vérellátási zavara, az ennek következtében fellépő gyulladással szövődmények kialakulásának veszélye megnő. A tüdő összenyomatása, a gátorüreg ellenoldalra átnyomódik, a légzés és keringés romlása fokozódik, és az esetleges hasi szövődményekkel együtt életveszélyes állapot alakul ki. A később felismert rekeszszakadások is műtéti megoldást igényelnek.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A szövődmenymentes esetek jól gyógyulnak, a rekeszizom szakadásának sikeres ellátása esetén mindkét testüregben visszaállnak az élettani viszonyok, a légzés és az emésztőrendszer működése rendeződik.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtét után, ha a behatolás vonalában a bordák porcok íve is átvágásra került, óvatos mobilizálás szükséges 3 – 4 hétig. Sikeres beavatkozás után 6 héttel a sérült korábbi tevékenységét folytathatja.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása