

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Bokaszalag sérülések

Hirtelen rossz mozdulat hatására bekövetkezhet csupán rándulás, tehát a szalagok megnyúlása, nagyobb erőbehatásra részleges vagy teljes szalagszakadás következhet be. Az esetek több, mint 90 százalékában a külbokaszalag szakad, rendszerint a szalag elülső és középső része, a hátsó szalag ritkábban sérül. Néha kis szakításos törés is látható a külboka csúcsán, vagy az ugrócsonton. Tartott felvétel az instabilitás kimutatására friss sérülés esetén csak akkor szükséges, ha műtétet végeznek; ilyenkor érzéstelenítés után Rtg. képerősítővel lehet dokumentálni a leletet.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Rándulás, részleges szakadást rövid ideig tartó nyugalomba helyezéssel, jegeléssel, felpolcolás után rugalmas pólyával kezelik. Teljes szakadás esetén is a legtöbb betegnél elegendő a gipszrögzítés 6 hétre.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a bokaízület nyugalomba helyezése, míg fájdalom megszűnik, illetve a szalagok gyógyulásának elősegítése.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- Ismétlődő kibicsaklás gyakori panasz, egyenetlen talajon járáskor a beteg bizonytalanul érzi a bokáját. A boka kibicsaklása általában megelőzhető a cipősarok külső részének megemeléssel, és sportoláshoz bokarögzítőt lehet viselni.
- Alsó végtagi rögzítések esetén a vérrögképződés kockázata megnő, ami miatt véralvadást gátló terápiát szükséges orvosa által meghatározott ideig alkalmaznia.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Az elszakadt szalagok műtéti ellátására sportolók, és hivatásos táncosok esetén van szükség.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

A sérülés igen lassan gyógyul, hónapokig fájdalmas és instabil maradhat a bokaízület.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Az esetek kis részében kialakult instabilitástól eltekintve teljes gyógyulás várható. Ha a bokaízület sokszor kibicsaklik, fájdalmas, műtét végezhető, a szakadt szalagokat saját ín áthelyezésével, vagy fiataloknál a külboka erős csonthártyájából képzett szalaggal pótolják.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Részleges szakadás, nagyobb fájdalom esetén gipszsínt helyeznek fel, majd 3 hétig bokarögzítőt visel a beteg, azután tornakezelésre jár 3-4 hétig. Teljes szakadás esetén a gipszlevétel után bokarögzítő viselhető, és el lehet kezdeni a tornát, a gyógyulás ideje általában 10 hét.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása