

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma:

Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Térdízületi szalagsérülés

A térdízület külső és belső szalagjainak sérülése az ízület instabilitását okozza. Keresztszalag sérülés térdízületi folyadék (vér-) gyülemmel (haemarthros) jár. A keresztszalagok sérülése, szakadása térdízületi instabilitást okozhat.

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Ízületi tükrözés (arthroscopia) során - mely 2-3 db 1-2 cm-es metszéssel jár - a vér lebocsátható az ízületből és az ízület átöblítésével a porcot károsító anyagok leszakadt szalagdarabok eltávolíthatók. Keresztszalag sérülésnél sokszor a szalagok pótlására van szükség. A pótláshoz a térdkalács szalagjának egy részét (csontos alappal)) vagy a hátsó combizmok hosszú inait használjuk fel, majd előzetes furat készítése után a korábbi szalag helyére csontcsatornába behúzzuk és beékeléssel, csavarral, kis lemezzel, koronggal rögzítjük.

2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:

Terápiás eljárás, amely célja a mozgásképesség ízületi stabilitás helyreállítása, társsérülések (porc-, meniscus sérülés) kivédése, késői kopásos károsodások elkerülése.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Műtési rekonstrukció során a feltárt régióban az operáció során sérülhetnek erek, idegek, a műtét után sebgyógyulási zavar, gyulladással szövődmény is kialakulhat- az esetek 2-4%-ában, melyek a műtét kockázatát képezik. Szükséges lehet ismételt műtetre ízületi folyadék felszaporodása esetén az ízület átmosására ritkán a behelyezett szalag eltávolítására. Gyulladással állapot legvégső esetében szükséges lehet az ízület elmerovítése. Az alsó végtagi műtétek és az alsó végtagok tartós külső rögzítése a vérrögképződést (vénás trombózis) és a vérrög tüdőérbe ékelődésének (tüdőembólia) esélyét megnövelik, emiatt orvosa véralvadást gátló kezelést fog javasolni.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtét szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként halálhoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Oldalszalag sérülés esetén gipszrögzítés, ortézis viselése 6 hétig, ritkábban - csontos leszakadás esetén - műtét beavatkozás csavaros rögzítés szükséges.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Kezelés nélkül az ízület instabil maradhat, társsérülések jöhetnek létre, később az ízület kopása jöhet létre.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A teljes stabilitás és térdízületi funkció helyreáll.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Műtétet követően 2-6 hétig ortézis viselése, gyógytorna szükséges. A teljes térdízület funkció visszanyerésének várható ideje 12 hét.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....

orvos aláírása és pecsétje

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása