

**Észak-Közép-budai Centrum**  
**Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**Gastroenterológiai Szakrendelés**

Vezető főorvos: Dr. Szilvás Ágnes Phd Ph.D.  
1125 Budapest, Diós árok 1-3  
Telefon: 458-4533 Internet: www.janoskorhaz.hu

**Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat kapszula endoszkópiás vizsgálatba**

**Beteg neve:**

**Születési idő:**

**Tajszám:**

**Cél:** A vékonybél rendellenességeinek felismerése.

Az eljárás során egy kis kapszulát (Given Imaging M2A Capsule) kell lenyelnie, amely az emésztőrendszeren természetes úton a perisztaltika segítségével halad végig, miközben felvételeket készít a gyomor- és bélrendszeréről.

A kapszula a felvételeket a hasfal bőrén elhelyezett érzékelőrendszernek (Sensor Array) továbbítja. Az érzékelőrendszer egy adatrögzítő készülékhez (Given Data Recorder) kapcsolódik, amely a felvételeket tárolja. Az adatrögzítő készülék egy derékra felcsatolható övben helyezhető el.

**A vizsgálat során a következő utasításokat szíveskedjék betartani:**

**A Kapszula Endoszkópia előtti napon:**

- A vizsgálat előtti napon ebéd után az orvosa által előírt folyékony diétát fogyaszthatja.
- Este 22 órától ne egyen és ne igyon semmit.
- A szokásos gyógyszereit egy korty vízzel még beveheti.
- Két órával a vizsgálat előtt már nem vehet be gyógyszert sem.
- A vizsgálatot megelőző 24 órában már ne dohányozzon.
- A férfi betegek a vizsgálat előtti napon a köldök alatti és feletti 15 cm-es bőrfelület - amennyiben szükséges - borotválják le.

**A Kapszula Endoszkópia napján:**

- Regisztrálásra kerül a vizsgálatban történő részvétele, és beleegyezését adja a vizsgálat elvégzéséhez.
- Az érzékelő rendszert felhelyezik a hasfalára, és csatlakoztatják az adatrögzítőhöz, amit a derekára felcsatolt övön helyeznek el.
- Majd a kapszula bevétele következik. •

**A kapszula bevétele után:**

- A kapszula bevétele után 2 órán keresztül nem ehet, nem ihat. 4 óra elteltével kisebb étkezés már megengedett. A vizsgálat befejezésével visszatérhet a megszokott étrendjéhez, amennyiben orvosa ettől eltérő utasítást nem ad az étkezésre vonatkozóan. Ha a vizsgálat után hányinger, hányás, hasi fájdalom jelentkezne, azonnal közölje orvosával.
- A kapszula bevitelétől kezdve nem tartózkodhat erős elektromágneses térben (MRI, amatőr rádió adó-vevő), amíg a kapszula a bélrendszerből nem távozik.
- A vizsgálat kb. 8 órán keresztül tart, ez idő alatt orvosa utasítását kövesse. A felszerelést ne szedje szét, és ne csatolja le a felszerelt övet. Az adatrögzítő egy kisméretű számítógépnek felel meg, kezelje óvatosan. Óvja a készüléket a hirtelen mozgásoktól, ütődésektől.
- A vizsgálat alatt 15 percenként ellenőrizze, hogy az adatrögzítő tetején levő fény felvillan-e másodpercenként kétszer. Ha bármilyen okból a kijelző felvillanásai abbamaradnak,

jegyzeze fel ennek időpontját, és értesítse orvosát. A vizsgálat alatt minden eseményt jegyezzen fel az eseménynaplóban, időponttal együtt (étkezés, ivás, testmozgás, szokatlan események).

A vizsgálat ideje alatt tartózkodjon a megerőltető testmozgástól, ami izzadással járhat

Lehetséges szövődmény:

A kapszula természetes úton, a bélmozgás segítségével távozik a szervezetből. Néhány esetben előfordulhat, hogy a kapszula nem tud a bélrendszerből távozni, ilyenkor endoszkópos, illetve sebészeti úton történő eltávolításra lehet szükség.

A betegtájékoztató elolvasása és a személyes tájékoztatás után a javasolt kapszulás endoszkópos vizsgálatba beleegyezem.

Budapest, 2021.

.....  
felvilágosítást adó orvos

.....  
beteg  
vagy

.....  
beavatkozást végző orvos

.....  
törvényes képviselője  
(név nyomtatott betűkkel aláírás)

Az orvosi felvilágosítás ellenére, mérlegelve a vizsgálat elmaradásának későbbi következményeit is, a kapszulás endoszkópos vizsgálatba nem egyezem bele.

Budapest, 2021.07.20.

beteg vagy

törvényes képviselője  
(név nyomtatott betűkkel, aláírás)