

CSONTVELŐ-MINTAVÉTEL SZEGYCSONTBÓL (STERNUM PUNCTIO)

Betegtájékoztató
(a beleegyező nyilatkozat 3. számú melléklete)

Kötelességünk, hogy betegségére tervezett kezeléséről részletesen felvilágosítsuk Önt, hogy a várható előnyök és a felmerülő szövődmények ismeretében írásos beleegyezését adhassa a kezeléshez.

A vizsgálat célja:

Az eddig megérkezett eredmények alapján betegségének természetét még nem lehet pontosan megmondani, ezért ehhez csontvelővizsgálatra van szükség.

Célja, hogy a csontvelőből mintát nyerhessünk és azt különböző célzott vizsgálatokra elküldjük, hogy a diagnózis felállításában és a további gyógykezelést illetően a kezelőorvos újabb információkhoz juthasson.

A vizsgálat menete:

A csontvelő-mintavételt minden esetben orvos végzi, a beteg a beavatkozás közben az ágyban háton fekvő helyzetben van. A mellcsont felett a bőrt fertőtlenítik, majd helyi érzéstelenítővel, vékony tűvel a bőr, a bőr alatti szövetek és a mellcsont érzéstelenítése következik. Ezután a megfelelő eszközzel a mellcsont üregébe szűrve egy kevés csontvelőt szívunk ki egy fecskendőbe, a sterilitás szabályainak megfelelően. A tű kihúzása után a szúrás nyomát steril gézzel befedjük és leragasztjuk. A kötést másnap lehet lecserélni, vagy eltávolítani.

Kérjük, hogy az alkalmazott jód illetve érzéstelenítő (általában Lidocain) miatt, esetleges allergiájáról tájékoztassa orvosát.

Gyakoribb szövődmények szegycsont-csapolás során:

Bőrvérzés, főleg olyan esetben fordulhat elő, mikor valamilyen alvadási eltérés van a betegnél.

Fertőzés, ezt steril eszközök alkalmazásával és a bőr gondos fertőtlenítésével igyekszünk elkerülni, de mint minden eszközös beavatkozásnál, kórokozók kerülhetnek a bőr alatti szövetekbe, a mellcsont üregébe. Igen ritkán fordul elő, és ha igen, akkor is gyógyítható.

A mellcsont üregén túlhaladó szúrás, megfelelően alkalmazott eszközbeállítással ennek előfordulása rendkívül ritka.

Gyógyszerallergia, bármilyen gyógyszer első alkalmazáskor kiderülhet, hogy a szervezet allergiás reakcióval válaszol, ilyenkor a megfelelő helyi és általános gyógyszeres kezeléssel a tünetek megszüntethetők.