



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Fül-Orr-Gége és Szájsebészeti Osztály

a Semmelweis Egyetem AOK Oktató Osztálya

Osztályvezető főorvos: Prof. Dr. Hirschberg Andor PhD. c. egyetemi tanár
1125 Budapest, Diós árok 1-3
Telefon: 458-4598 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-FOG-37

FÜLKORREKCIÓ

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A túlzottan elálló, nagyméretű, vagy aszimmetrikus megjelenésű fül sokak számára komoly problémát okoz, akár már gyermekkorban is. A fülkorrekció a fül alakjának, méretének, helyzetének megváltoztatása céljából végzett műtéti beavatkozás, mely során javíthatunk a túlzottan elálló, nagyméretű vagy valamilyen okból nem szokványos alakú, aszimmetrikus fülek megjelenésén.

Alaki eltérések kialakulhatnak szerzetten is, legtöbbször baleset, daganatos elváltozás miatt. A fülbevaló vagy tágitó viselése során a fülbevalólyuk kitágulhat, de át is szakadhat. Ezeknek a korrekciója is elvégezhető.

A súlyosabb fejlődési rendellenességek bonyolultabb eljárásokkal korrigálhatók, melyhez szükség lehet a test más területéről vett porc (pl. ellenoldali fül, borda), bőr átültetésére több alkalommal végzett műtéti sorozat révén.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

A fülplasztika számos műtéti technikát magában foglal, amelyek a fül kontúrjának, méretének és helyzetének javítását szolgálják. A fülplasztikát helyi érzéstelenítésben és altatásban is végezhetjük. A metszésvonalakat az esetek döntő többségében a fül mögött vezetjük és alig észrevehető heggel gyógyul. Ha a fül elülső felszínén szükséges metszést ejtenünk, azt minden esetben a fül természetes redőiben vezetjük, hogy a hegek ne látszódnak és minél kedvezőbb esztétikai hatást érhessünk el. Azért, hogy a megfelelő eredményt elérjük, átalakítjuk, vagy eltávolítjuk a felesleges porcot és bőrt. A műtét során természetes redőzetet alakítunk ki a fül elülső felszínén.

A műtétet követően 1 hétig a fülre nyomókötetést helyezünk.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei

a. Tipikus, illetve gyakori jelenségek a műtét után

A műtéti területről enyhe véres szivárgás 1-2 napig előfordulhat, mely spontán szűnik. Enyhe, közepes, feszítő, tompa fájdalom is előfordulhat, de kifejezett fájdalom esetén kontrollra szükséges jelentkezni.

b. Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények műtét után

Bár a hegek jelenléte elkerülhetetlen egy műtéti beavatkozás során, az esetek döntő többségében hegek a fül mögött, vagy a fül természetes redőiben elrejtve, alig lesznek láthatók. Kórosan megvastagodott hegek jöhetnek létre (3/100), amelyek hegdaganat, azaz keloid-képződés esetén kiterjedtek is lehetnek (2/100), mely további utókezelést, esetleg újabb műtétet és röntgen besugárzást tesz szükségessé.

A fülplasztika, más műtéti beavatkozásokhoz hasonlóan, magában rejti a vérzés és fertőzés (4/100) veszélyét, Erősebb korai és késői utóvérzés (3-5/100) ismételt feltárást tehet szükségessé. Vérömleny alakulhat ki, mely ha befertőződik, akkor szövetközi gyulladás, esetleg tályog (1/100) alakulhat ki. A fülplasztikát követően változhat a bőr érzékelése a fülön és a fül környezetében. Ezek az érzékelés-zavarok általában átmenetiek. Aszimmetria létrejöhet a gyógyulási folyamat során történő változások miatt, de az is elképzelhető, hogy a fülplasztika nem képes sikeresen korrigálni a már régebb óta fennálló aszimmetriát, vagy akár túlzott korrekció révén a fülkagyló túlzottan a koponyához simul. A fül új helyzetét varratok segítségével alakítjuk ki, amelyek gyulladást hozhatnak létre. Ezért előfordulhat, hogy a varratokat hamarabb el kell távolítanunk. Allergiás reakció alakulhat ki a beavatkozás során és a kötözéshez használt anyagokra, azonban ez ritkán fordul elő. A behelyezett öltések is kiválthatnak szöveti reakciót, sőt a felszínre is kerülve láthatóvá is válhatnak (1/100). Elégtelen eredményhez számos ok vezethet (6-12/100). Hallójárat szűkebbé válhat, mely miatt tisztíthatóság-tisztulás zavart szenvedhet, hallójáratí illeszték készítése nehezebbé válhat. A saját anyag vételi helyének megfelelően is kialakulhatnak súlyos szövődmények: pl. bordaporc vétele esetén légmell, mellkasi gyulladás, vérzés, tályog; ellenoldali fülporc vétele során a fül alakjának torzulása, gyulladása, ellenoldalihoz képest alaki, méretkülönbsége.

c. Extrém (nagyon) ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények műtét után

Bőr, vagy porcelhalás következtében maradandó alaki, formai, méretbeli eltérés jöhet létre, mely miatt további korrekciós műtétek válhatnak szükségessé.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint Intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Legtöbbször nincs alternatív eljárás. Teljes fülhiány esetén protézis alkalmazható.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

A fülkorrekció műtét az esetek jelentős részében életminőséget javító beavatkozás, elhagyásának általában nincs súlyos következménye, de tudni kell, hogy egyéntől függően a kozmetikai deformitások lelki és pszichés sérüléseket is kiválthatnak.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A sikeres műtét megítélése általában szubjektív és eltérő lehet a beteg és az orvos szemszögéből. Amennyiben a páciens életminősége javul és a műtét előtti panaszok többsége mérséklődik vagy megszűnik, a műtét sikeresnek véleményezhető. A sikerességhez az eredmény tartóssága szintén hozzájárul(hat).

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtét napján fekvés, rendszeres folyadékfogyasztás és szükség esetén fájdalomcsillapítás szükséges. A műtéti megterhelés miatt a műtét után néhány napig szédülékenység alakulhat ki - különösen erre érzékeny egyéneknél -, ezért ilyenkor az ápolónők segítségét és tanácsát kell kérni. A műtétet követően diszkomfort-érzés, fájdalom előfordulhat, amely általában szájon át szedhető fájdalomcsillapítókkal megfelelően uralható.

A műtét után körkörös kötés helyezünk fel. Az új formát speciális nyomókötéssel rögzítjük, amit 1 hétig érintetlenül hagyunk, mert eltávolítása, elcsúszása, elmozdítása az elérhető eredményt, a fül alakját veszélyezteti. Erre a páciensnek figyelnie kell a műtét utáni időszakban! Vigyázni kell, hogy víz ne érje a kötést! A kötést és a bőrvarratokat is 1 hét elteltével távolítjuk el.

A kötés eltávolítása után a fülek védelme érdekében még 5 hétig éjszakára a füleket le kell kötni (hajpánt, kendő, sál), hideg, meleg ne érje (érzékeny a hőhatásokra). Körülbelül 1 héttel a beavatkozás után vissza lehet térni a hétköznapi élethez, azonban 3 hét fizikai kímélet, pihenő életmód javasolt.

A duzzanat jelentős része és az elszíneződés csak hetek alatt múlik el. A műtétet követő 2 hónapig külső mechanikus behatásoktól (labdajáték, küzdősport, stb.) óvni kell a fülkagylót, mert amíg a hegesedés megbízhatóan nem stabilizálja a műtéttel elért formát, addig az külső behatásra bármikor visszaállhat eredeti helyzetébe.

Mivel az emberi test sem teljesen szimmetrikus, nem várható, hogy a műtét után kialakuló forma, a műtéti heg minősége és helyzete teljesen szimmetrikus legyen.

Kerülendő minden olyan tevékenység, amely a fejben nyomásemelkedést okoz. Utóvérzés, arc-, fejtáji duzzanat, tartós fejfájás, magas láz esetén azonnali kontrollvizsgálat javasolt.

A műtétet követően a fülek duzzanata általában kismértékű, így rögtön a beavatkozást követően látható a változás. A kötés eltávolítása után a fülek minimálisan még duzzadtak lehetnek, de a fül új helyzete és kontúrja már látható. A duzzanat teljes megszűnését követően a fül megjelenése még esztétikusabbá válhat, ez a folyamat akár 2-3 hónapig tarthat.

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása