



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

010610401 Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Végh György Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458-4592 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-SZÜL-02

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

FELTÁRÓ HASI MŰTÉT (EXPLORATÍV LAPAROTOMIA)

1. Az ajánlott kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Exploratív laparotomia = feltáró hasi műtét. Tájékoztató hasi műtét. A korábban elvégzett vizsgálatok olyan elváltozást, elváltozásokat valószínűsítettek, amely műtéti beavatkozást tesznek szükségessé. A hasüreg megnyitását követően az elváltozás, elváltozások pontos feltérképezését követően, amennyiben gyógyító jellegű sebészi beavatkozásra módunk nyílik, azt elvégezzük. A beavatkozás az elváltozás természetétől, és a beteg beleegyezésétől függően jelentheti a női kismemencei szervek részleges, vagy akár teljes eltávolítását is. Komplikációk esetén szükségessé válhat társszakmák bevonása, sebészeti, urológiai konzílium, és a műtét kiterjesztésére is sor kerülhet.

2. Az ajánlott beavatkozás és gyógymód célja:

Diagnosztikus és / terápiás eljárás.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- **Erős vérzés:** amely vérátömlesztést igényel. A vérátömlesztés nagyon ritkán fertőzést /pl hepatitis-májgyulladás/ okozhat.
- **Környező szervek sérülése:** /pl. húgyvezeték, húgyhólyag, belek/. Ennek veszélye minden esetben nagyobb, amikor is gyulladások, daganatok vagy előzetes műtétek összenövésai folytán az anatómiai helyzet eltér a szokásostól.
- **Idegek kompressziós sérülése:** általában időleges, pár hét alatt a tünetek megszűnnek. Ezek általában hosszabb műtétek esetén a műtőasztalon való fekvésből adódnak, fő tünete az adott testrészletre vonatkozó érzészavar, mozgáshiány.
- **A vizeletürítés zavara:** általában rövid ideig tart, katéter visszahelyezésével 1-5 nap alatt rendeződik.
- **Utóvérzések:** esetleg több nappal a műtét után: újabb műtétet ill. vérátömlesztést igényelhet.
- **Hasi, háti, mellkasi fájdalom:** általában maguktól megszűnnek.
- **Túlérzékenység:** a kapott gyógyszerekre, fertőtlenítőszerre.
- **Gyulladás:** a műtéti területen vagy a hasfalban: ezek a gyulladások antibiotikum kezelésre általában pár nap alatt teljesen megszűnnek. A hasfali gyulladások tünetei: fájdalom, bőrpír, váladékozás, a hasfal egyes, ritkán összes rétegeinek szétválása: általában localis has kezelést, de az esetek egy részben újabb hasfalzáró műtétet igényelnek.
- **Tályog illetve fistula:** a környező szerveken: igen ritka szövődmények, általában műtéti beavatkozást igényelnek.
- Gyógyszer bevételekor félrenyelés, fuldoklás, sürgős műszeres gégeszeti beavatkozás válhat szükségessé. Ritkán allergiás reakciók, bőrjelenségek jelentkezhetnek.
- **Izomba adott injekciók, infúziós kezelés:** véna gyulladása, vérrögösödés, trombózis, tartós gyulladás jelentkezhet. Az infúziós folyadék a véna sérülése során a szövetek közé kerülhet, gyulladást, elhalást, hegesedést, a végtag tartós, vagy maradandó károsodását okozhatja.
- **Vérátömlesztés:** súlyos allergiás reakciót, életveszélyes keringés és veseműködés romlást, nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyítható vírusfertőzést (pl. HIV, krónikus májgyulladások) okozhat.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

A fenti indikációk alapján tervezett feltáró hasi műtétnek az esetek döntő többségében nincs alternatívája.

5. Kezelés elhagyásának várható következménye:

Az Önnél előzetes vizsgálatainkal valószínűsített elváltozás, elváltozások jellegének további pontosabb meghatározása, és esetleg sebészi terápiás megoldása elmarad, így állapotrosszabbodás léphet fel.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A siker ebben az esetben a műtétet indikáló elváltozás (ok) pontos diagnosztizálása, illetve a műtéti szituáció függvényében elvégezhető gyógyító beavatkozás elvégzését jelenti.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A hasseb fájdalma, az esetlegesen fellépő, a fentiekben vázolt szövődmények. A gyógyulás időtartama szövődménymentes esetben 4-6 hét.

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása