



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

010610401 Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Végh György Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458-4592 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-SZÜL-09

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

FENYEGETŐ KORASZÜLÉS (PARTUS PRAEMATURUS IMMINENS)

1. A tervezett beavatkozás leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Fenyegető koraszüléstről beszélünk a terhesség betöltött 24. hetét követően azokban az esetekben, amikor az anyai és/vagy a magzati kóros állapotok hatására a koraszülés megfelelő kezelés nélkül nagy valószínűséggel bekövetkezik. Ennek megelőzésére az alábbi kezelési módokat és protokollokat alkalmazzuk.

Intravénás, vagy szájon át történő magnéziumkezeléssel csökkentjük a méhösszehúzóerőket. Szükség esetén a simaizom receptorokra szelektíven ható infúziós készítmények alkalmazását, továbbá a vénás vagy szájon át történő antibiotikum terápia tartjuk hatásosnak. Amennyiben laborvizsgálatokkal és hüvelyváladék tenyésztéssel fertőzést nem igazolunk, a kezelést elegendőnek tartjuk ágynyugalom mellett méhlazító készítményekkel folytatni.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Kórismézni, majd megszüntetni a fenyegető koraszülést kiváltó okokat, mérsékelni, majd megszüntetni a tüneteket. Észlelni és követni a magzat megfelelő fejlődését.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Bármely beadott gyógyszerrel szemben váratlanul túlérzékenységi reakció léphet fel. Az alkalmazott antibiotikumok kellemetlen tünetekkel járó hüvelygombásodást okozhatnak, amely egy időben alkalmazott helyi gombaellenes készítményekkel kezelhető. A magnézium infúzió alkalmazása hirtelen kipirulást, meleg érzetet, továbbá álmoságot, mélyebb hangulati állapotot, tompult koncentrációképeséget okozhat. A béta receptorokra ható készítmények alkalmazása során a szívfrekvencia a kalcium-csatornákra ható, szívfrekvenciát csökkentő gyógyszerek együttes alkalmazása ellenére is megemelkedik, amely kellemetlen szívdobogásérzést, súlyos esetben mellkasi panaszokat, igen ritkán szívinfarktust okozhat.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése: Nincsenek.

5. Kezelés elhagyásának várható következménye:

Kezelés nélkül nagy valószínűséggel előbb-utóbb koraszülés következik be. Ennek megakadályozása a fizikai aktivitás lényeges csökkentése, szükség esetén szigorú ágynyugalom megtartása révén lehetséges, továbbá a segíteni akaró orvosokkal való együttműködés, és az általuk javasolt készítmények alkalmazásával érhető el.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Amennyiben ultrahang vizsgálattal élő, fejlődő terhességet látunk, emellett a méh feszülés leáll, a vérzés megszűnik, a fertőzött hüvelyváladékban kórokozó már nem mutatható ki, és ultrahang vizsgálattal a korábban esetlegesen észlelt vérömleny felszívódik, vagy szervül, ekkor a fenyegető koraszülés állapota már nem áll fenn, a terhest gyógyultnak tartjuk.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Fenyegető koraszülés gyógyulása után a terhességet veszélyeztető állapot elkerülése érdekében a terhes nőnek hetekig kímélő életmódot kell folytatnia. Otthonában pihenés, bő folyadékfogyasztás, amennyiben szükséges további görcsoldó, vércépző terápia alkalmazása javasolt.

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kénysertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása