



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

010610401 Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Végh György Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458-4592 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-SZÜL-10

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

FENYEGETŐ VETÉLÉS (ABORTUS IMMINENS)

1. A tervezett beavatkozás leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

Fenyegető vetélésről beszélünk a terhesség betöltött 24. hetéig azokban az esetekben, amikor az anyai és/vagy a magzati kóros állapotok hatására a vetélés megfelelő kezelés nélkül nagy valószínűséggel bekövetkezik. Ennek megelőzésére az alábbi kezelési módokat és protokollokat alkalmazzuk.

Koraterhességben a 12. terhességi hétig általában szájon át történő magnéziumkezeléssel csökkentjük a méhösszehúzóerőket. Fertőzött hüvelyváladék esetén antibiotikummal egészítjük ki a kezelést. Kevés barnás, véres hüvelyváladékozást vérzéscsillapító készítményekkel szüntetjük meg. Mesterséges megtermékenyítés (lombikprogram) segítségével fogant terhességek esetén a 12. hétig fontosnak tartjuk a terhességi hormon (progeszteron) hüvelyen, vagy szájon keresztül pótlását. Nagyobb terhességek vetelésének megakadályozása céljából infúziós magnézium, szükség esetén a simaizom receptorokra szelektíven ható infúziós készítmények alkalmazását, továbbá vénás antibiotikum terápiát tartjuk hatásosnak. Amennyiben laborvizsgálatokkal és hüvelyváladék tenyésztéssel fertőzést nem igazolunk, a kezelést elegendőnek tartjuk ágynyugalom mellett méhlazító készítményekkel folytatni.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Kórismézni, majd megszüntetni a fenyegető vetélést kiváltó okokat, mérsékelni, majd megszüntetni a tüneteket. Észlelni és követni a magzat megfelelő fejlődését.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Bármely beadott gyógyszerrel szemben váratlanul túlérzékenységi reakció léphet fel. Az alkalmazott antibiotikumok kellemetlen tünetekkel járó hüvelygombásodást okozhatnak, amely egy időben alkalmazott helyi gombaellenes készítményekkel kezelhető. A magnézium infúzió alkalmazása hirtelen kipirulást, meleg érzetet, továbbá álmoságot, mélyebb hangulati állapotot, tompult koncentrációképeséget okozhat. A béta receptorokra ható készítmények alkalmazása során a szívfrekvencia a kalcium-csatornákra ható, szívfrekvenciát csökkentő gyógyszerek együttes alkalmazása ellenére is megemelkedik, amely kellemetlen szívdobogásérzést, súlyos esetben mellkasi panaszokat, igen ritkán szívinfarktust okozhat. A vetélés elkerülése érdekében alkalmazott hormonkészítmények igen ritkán trombózis kialakulását eredményezhetik.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése: Nincs.

5. Kezelés elhagyásának várható következménye:

A fenyegető vetélések kezelés nélkül nagy valószínűséggel előbb-utóbb a terhesség korai megszakadásához, veteléshez vezetnek. Ennek megakadályozása a fizikai aktivitás lényeges csökkentése, szükség esetén szigorú ágynyugalom megtartása révén lehetséges, továbbá a segíteni akaró orvosokkal való együttműködés, és az általuk javasolt készítmények alkalmazásával érhető el.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Amennyiben ultrahang vizsgálattal élő, fejlődő terhességet látunk, emellett a méhfeszülés leáll, a vérzés megszűnik, a fertőzött hüvelyváladékban kórokozó már nem mutatható ki, és ultrahang vizsgálattal a korábban észlelt véromlenny felszívódik, vagy szervül, ekkor a fenyegető vetélés állapota már nem áll fenn, a terhest gyógyultnak tartjuk.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Fenyegető vetélés gyógyulása után a terhességet veszélyeztető állapot elkerülése érdekében a terhes nőnek hetekig kímélő életmódot kell folytatnia. Otthonában pihenés, bő folyadékfogyasztás, amennyiben szükséges további görcsoldó, vérképző terápia alkalmazása javasolt.

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása