



## MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: ..... TAJ száma: ..... Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

### MŰSZERES BEFEJEZÉS (CURETTAGE UTERI)

#### 1. Az ajánlott kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A méhen belül elhalt terhesség esetén a méhür curette kanállal történő kiürítése. A még nem szült terhesek esetében és előzetes császármetszés után a méhnyak gyógyszeres, vagy lamináriával történő előtágítása történik.

Beavatkozás technikája: a műtét végezhető a beteg kérése szerint rövid idejű vénás altatásban, vagy helyi érzéstelenítésben.

A méhnyak tágítása: tengeri növényekből (*Laminaria japonica*) készült 6-8 cm-es pálcák segítségével, melyek nedvesség hatására 3-5-szörös vastagságúra duzzadnak. A hüvelyt fertőtlenítő oldattal kitöröljük, a méhürt megszondázzuk, a méhnyakat fém pálcákkal feltágítjuk, és a méhürt curette kanállal kiürítjük.

#### 2. Az ajánlott beavatkozás és gyógymód célja:

A méhen belül elhalt terhesség esetén a méhür curette kanállal történő kiürítése.

#### 3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szemben túlérzékenységi reakció léphet fel. A műtét során igen ritkán a méhfalon áthatoló sérülés keletkezhet. Ez kórházi megfigyelést, antibiotikumos kezelést, szükség esetén hasi műtétet vonhat maga után, igen ritkán nagyfokú vérzés alakulhat ki, mely transzfúzió adását teheti szükségessé, igen ritkán ez akár életet is veszélyeztethető mértékű lehet. A műtétet követően gyulladás alakulhat ki, mely gyógyszeres kezeléssel általában megszüntethető. Esetlegesen visszamaradt magzati szövetelemek alhasi görcsökkel társult vérzést okozhatnak, mely ismételt műtéti beavatkozást vonhat maga után. Késői szövődményként a méhüreg összenövése miatt meddőség alakulhat ki.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

**A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!**

#### 4. Alternatívák ismertetése:

A műtéti úton kívül lehetőség van, megvárni a vetélés spontán lezajlását, mely lehet akár ún. komplett, mely a műtét elvégzését szükségtelenné teszi.

#### 5. Kezelés elhagyásának várható következménye:

A műtét elvégzése nélkül, a vetélés spontán beindulhat, mely erős görcsös fájdalmat, illetve erős vérzést okozhat, sürgős műtétet indikálva, mely nagyobb kockázattal jár, mint egy tervezett műtét, illetve a műtét elvégzése nélkül a méhüreg fertőzései is nagyobb veszélyt jelentenek mint a tervezett időpontban elvégzett műtét esetén. A vetélés amennyiben nem komplett, tehát szövetrészek maradnak a méhüregben, folyamatos vérzést tarthatnak fenn, illetve gyulladásához vezethetnek, mely következtében olyan állapotok alakulhatnak ki, mely sürgős gyógyszeres és/vagy műtéti beavatkozást igényelnek.

#### 6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A műtét elvégzése szövődmény nélkül jelenti a sikeres beavatkozást, melynek valószínűsége a terhesség nagyságától, a beteg fizikó-sociális állapotától, műtéti körülményektől függ.

#### 7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A műtétet követően gyulladás alakulhat ki, mely gyógyszeres kezeléssel általában megszüntethető. Esetlegesen visszamaradt magzati szövetelemek alhasi görcsökkel társult vérzést okozhatnak, mely ismételt műtéti beavatkozást vonhat maga után. Kialakulhat méhszáj hegesedés vagy szűkülés is, mely szintén ismételt műtéti beavatkozást vonhat maga után. Késői szövődményként a méhüreg összenövése miatt meddőség alakulhat ki. Szövődménymentes esetben egyéntől függően 2-3 napos gyógyulás várható.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

**NYILATKOZAT**

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kénysertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....  
**orvos aláírása és pecsétje**

.....  
**beteg (törvényes képviselő) aláírása**