



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

010610401 Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Végh György Ph.D.

1125 Budapest, Diós árok 1-3

Telefon: 458-4592 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-SZÜL-15

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

HÜVELYI MÉHELTÁVOLÍTÁS A FÜGGELÉK (-EK) ESETLEGES ELTÁVOLÍTÁSÁVAL

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A méh teljes eltávolítása hüvelyen keresztül. A petefészek és/vagy a petevezeték eltávolítása hüvelyen keresztül. / Hysterectomia totalis per vaginam. Adnexectomy per vaginam/

- Panaszokat okozó jóindulatú méhizomdaganatok /myoma/ esetében.
- Méh süllyedése a hólyaggal együtt vagy anélkül.
- Rendszertelen, bő vérzések esetében, amelyet más módon befolyásolni nem lehet.

2. A tervezett beavatkozás és gyógmód célja:

Terápiás eljárás.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- **Erős vérzés:** amely vérátömlesztést igényel. A vérátömlesztés nagyon ritkán fertőzést /pl hepatitis-májgyulladás/ okozhat.
- **Környező szervek sérülése:** /pl. húgyvezeték, húgyhólyag, belek/. Ennek veszélye minden esetben nagyobb, amikor gyulladások, daganatok vagy előzetes műtétek összenövésai folytán az anatómiai helyzet eltér a szokásostól.
- **Idegek kompressziós sérülése:** általában időleges, pár hét alatt a tünetek megszűnnek. Ezek általában hosszabb műtétek esetén a műtőasztalon való fekvésből adódnak, fő tünete az adott testrészletre vonatkozó érzészavar, mozgáshiány.
- **A vizeletürítés zavara:** általában rövid ideig tart, katéter visszahelyezésével 1-5 nap alatt rendeződik.
- **Utóvérzések:** esetleg több nappal a műtét után : újabb műtétet ill. vérátömlesztést igényelhet.
- **Hasi, háti , mellkasi fájdalom:** általában maguktól megszűnnek.
- **Túlérzékenység:** a kapott gyógyszerekre, fertőtlenítőszerre.
- **Gyulladás:** műtéti területen: ezek a gyulladások antibiotikum kezelésre általában pár nap alatt teljesen megszűnnek.
- **Tályog illetve fistula a környező szerveken:** igen ritka szövődmények, általában műtéti beavatkozást igényelnek.
- Egyes szövődmények esetében szükség lehet a műtét **hasi úton** történő folytatására.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, **bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.**

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Az esetek többségében nincs alternatív eljárás. A méhsüllyedés egyes eseteiben hüvelygyűrű felhelyezése jöhet szóba, mely műtét nélkül megoldható, de általában ez végleges megoldást nem, csak tüneti kezelést jelent.

5. Kezelés elhagyásának várható következménye:

- Vérzést okozó alapfolyamat esetén súlyos fokú, majd az életet is veszélyeztető vérszegénység alakulhat ki.
- Améh süllyedése fokozódhat, vizelettartási nehézség (-képtelenség) alakulhat ki.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A műtéti siker valószínűsége nagymértékben függ a műtét közben talált szituációtól.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

Hüvelyi vérzés, vizeletürítéssel kapcsolatos problémák, széklethabitus változás, hasi fájdalom. A gyógyulás időtartama kb. 2-4 hét.

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása