



Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
010611100 Urológiai-Sebészeti Osztály
a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya

Osztályvezető főorvos: Dr. Domján Zsolt
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Telefon: +36-1-458-4500/ 4644 Internet: www.janoskorhaz.hu

BE-UROL-32

**MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A
BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA**

Beteg neve: TAJ száma: Születési dátuma:

Tájékoztatót adó orvos neve:

Kettős-J húgyvezeték katéter (Double J) húgycsővön keresztül történő eltávolítása

baloldali jobboldali kétoldali

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:

A beavatkozás leggyakrabban helyi érzéstelenítésben, ritkábban gerincközeli érzéstelenítésben vagy altatásban végezzük. A beavatkozás kőmentső helyzetben történik. A húgycsőnyílást és környékét fertőtlenítjük. Tükrözéssel vizsgálattal a húgycsővön át egy fém eszközzel a húgyhólyagba jutunk, majd az eszköz munkacsatornáján keresztül eltávolítjuk a húgyvezetékbe korábban felvezetett kettős-J katétert.

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

A korábban felvezetett kettős-J katéter eltávolítása.

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

- A tükrözést követő órákban és napokban, a nyálkahártya felületes sérülése miatt a vizelés kellemetlen, esetenként fájdalmas lehet, vizelete véressé válhat. Ezek a jelenségek önmagukban nem kóros elváltozások.
- Vizeletrekedés miatti átmeneti katéter viselés.
- Nagyobb fokú vérzés, alvadékok miatti vizelési képtelenség miatt átmeneti katéter-viselés válhat szükségessé. Nagyobb az előfordulás valószínűsége amennyiben véralvadásgátló terápiában részesül.
- A beavatkozás során előfordulhat a húgycső-sérülés (húgycső álút képződés), ami húgycső szűkülethez vezethet
- A beavatkozás során előfordulhat a hólyag nyálkahártya, ritkábban a hólyagfal olyan mértékű sérülése (kilyukadása), amely egy hetes katéter viselést, nagyon ritkán műtéti ellátást igényelhet.
- Urethritis (húgycsőgyulladás), cystitis (húgyhólyaggyulladás), prostatitis (prostata gyulladás), epididymitis (mellékhere gyulladás), pyelonephritis (vesemedence gyulladás), ritkán széptikus állapot alakulhat ki, melyek gyógyszeres kezelést, szükség esetén kórházi felvételt igényelnek. Egyoldali mellékhere gyulladás esetén a nemzőképesség megtartott, amennyiben az ellenoldali here működése ép. Kétoldali mellékhere gyulladás, mely nemzőképtelenséghez vezet.
- Merevedési és vizelettartási zavarok.
- Kettős-J katéter felcsúszása a húgyvezetékbe.
- Kettős-J katéter eltávolításának nehezítettsége/ lehetetlensége (pl. idő előtti kövesedés miatt), ami további beavatkozásokat tehet szükségessé.
- Minden fent megnevezett szövődmény további kezelést, szükség esetén kórházi felvételt tehet szükségessé, adott esetben műtéti feltárássra is sor kerülhet.
- Ha kezelőorvosa az eltávolítást követően, a kontroll vizsgálatok alkalmával nem megfelelő vizeletfolyást tapasztal (pl. vesetájéki görcsös fájdalom, UH-on észlelt üregrendszeri tágulat), a kettős-J katéter ismételt felhelyezése szükségessé válhat.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

4. Alternatívák ismertetése:

Az eltávolításnak alternatívája nincs.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:

Az el nem távolított kettős-J katéter a gyártó által javasolt viselési időn túl a vizeletfolyást biztosítani nem tudja, elkövesedhet, vesefunkció romlást okozhat, húgyúti fertőzést tarthat fent. Ezek következtében kialakulhat húgyvezeték- és vesemedence tágulat, vesemedence gyulladás, húgyhólyag gyulladás, férfiaknál prostata- és mellékhere gyulladás, vérmérgezés, vesekárosodás, vese leállás, húgyvérűség, mely átmeneti vagy tartós vese katéter viselést, esetleg műveze kezelést, veseeltávolítást tehet szükségessé, végső soron halához is vezethet.

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

A kettős-J katéter eltávolítása általában sikeres. A korábban vizeletelterelést szükségessé tevő ok elhárítását követően, a normál vizeletfolyás jelenti a teljes sikerességet.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:

A beavatkozás után fogyasszon bőven folyadékot, a hólyagban és a húgycsőben keletkező mikrosérülések által okozott panaszok mielőbbi megszüntetése céljából. A beavatkozást követően, korábbi vizelet tenyésztés eredményének megfelelően, célzott antibiotikus terápia szükséges a vizelet feltisztítása miatt. Feltétlenül értesítse orvosát, ha vizsgálatot követően spontán vizelésre képtelen, ha vizeléskor csillapíthatatlan fájdalmi jelentkeznek, ha húgycsővéből tartós vérzést észlel, ha csillapíthatatlan fájdalmi vannak, vagy ha láza jelentkezik! Kontroll vizsgálatra (vese UH) a kezelőorvosával megbeszéltek szerint jelentkezzen!

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....
.....

NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtevesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest,

.....
orvos aláírása és pecsétje

.....
beteg (törvényes képviselő) aláírása