



**Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő**  
**010611100 Urológiai-Sebészeti Osztály**  
**a Semmelweis Egyetem ÁOK Gyakorló Osztálya**

Osztályvezető főorvos: Dr. Domján Zsolt  
1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Telefon: +36-1-458-4500/ 4644 Internet: [www.janoskorhaz.hu](http://www.janoskorhaz.hu)

**BE-UROL-30**

**MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A  
BETEG BELEEGYZŐ NYILATKOZATA**

Beteg neve: ..... TAJ száma: ..... Születési dátuma: .....

Tájékoztatót adó orvos neve: .....

**MELLÉKHERECYSTA NYÍLT MŰTÉTI BEAVATKOZÁSA (SPERMATOCELECTOMIA)**

**1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja:**

A mellékherecysta a here, vagy a mellékhere mellett elhelyezkedő folyadék tartó képlet, mely helyzeténél fogva okoz kellemetlenséget. Bizonyos esetekben progresszív növekedés vagy fájdalom jelentkezhet a folyadék tartó képlet helyén, mely az abban lévő folyadékfeszítő hatása miatt keletkezik. Ezek a fájdalmak spontán, maguktól is megszűnhetnek, illetve állandósulhatnak.

A műtét helyi érzéstelenítésben zajlik. A műtét beavatkozása során a megfelelő oldalon ejtett hosszanti metszésből a herét, mellékherét előemeljük, a hereburkok megnyitása után a folyadék tartó képletet kipreparáljuk és eltávolítjuk, a hereburkokat kifordítjuk vagy kiirtjuk, a sebvonalat egyesítjük.

**2. A tervezett beavatkozás és gyógy mód célja:**

Terápiás eljárás, amely a betegséget megszünteti.

**3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:**

- Műtét utáni vérzéses szövődmény: 1-2% (súlyosabb esetben igényel csak műtét megoldást)
- Sebgyógyulási zavar, tályogképződés a műtét területén, ami nyitott sebkezelést igényelhet egy-két hétig.
- Herevízsérv kialakulása, a megváltozott nyirokkeringési viszonyok miatt
- Nagyon ritka esetben húgyvezeték, -ondóvezeték sérülés, ondósejtképzés károsodás, heresorvadás, hereelhalás
- Mélyvénás trombózis: megfelelő megelőzés (LMWH injectio, fásli, korai mobilizálás) mellett ritkán fordul elő, jól kezelhető
- Műtét során kialakult kórházi fertőzések: vizelet vagy széklet (clostridium difficile): A korszerű antibiotikum politika (megelőzés, kezelés) mellett nem gyakori, de 10-20%-ban előfordulhat és megfelelő kezeléssel gyógyítható.
- Ritkán olyan mértékű hegesedés alakulhat ki műtétet követően a mellékhere érintett területén, ami ondóúritési akadályt, ezáltal a nemzőképesség csökkenését okozhatja.

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.

A műtét szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek!

**4. Alternatívák ismertetése:**

Az esetek többségében nincs alternatív eljárás. Egyes esetekben szóba jön: Beavatkozás nélküli megfigyelés.

**5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:**

Hímivarsejt képzési zavar, a nemzőképesség csökkenése, herefájdalom, herenagyobbodás, heresorvadás, esetleg rosszindulatú daganat kialakulása a cysta falában.

**6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:**

A herében történik a spermaképzés, s ennek kiürülését a cysta mechanikusan gátolhatja. Műtét után a hímivarsejt-képzés, a

spermakép javulása várható. Szövetteni vizsgálat a rosszindulatú daganat kizárására alkalmas. A műtét az esetek 94%-ában sikeres.

Kiújulás ritkán elfordulhat, ilyenkor ez nem a műtét sikertelenségét jelzi, hanem egy másik ondjárat lezáródása következtében jöhet létre.

**7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma:**

A műtét után a herezacskó duzzanata alakulhat ki, mely egy-két hét alatt fokozatosan megszűnik. Műtét után tartózkodjon a fizikai megterheléstől egy hónapig és a kezdeti időszakban, viseljen olyan alsónadrágot, mely a herét felemeli, tartja. Amennyiben a herezacskó bevérzése jelentkezett, általában egy-két hét alatt felszívódik. A műtétet követően egy napig ágynyugalom javasolt. Ügyeljen arra, hogy a sebgyógyulás 8 napos időtartalma alatt tisztálkodása során víz ne érje a sebet, mert ezzel a zavartalan sebgyógyulást veszélyeztetheti.

Otthonába bocsátását követően az első munkanapon jelentkezzen házi orvosánál.

**8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:**

.....  
.....  
.....

**NYILATKOZAT**

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

A beavatkozás olyan, orvosiilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Egyetértek az orvosiilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

Budapest, .....

.....  
**orvos aláírása és pecsétje**

.....  
**beteg (törvényes képviselő) aláírása**