



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
I-XII. ker. Tüdőgondozó Intézet és Szűrőállomás
Intézetvezető: Dr. Vasas Szilvia főorvos
1122. Budapest, Pethényi köz 1.
Telefon: 355-8322, Internet: www.janoskorhaz.hu
[email: tudogondozo@janoskorhaz.hu](mailto:tudogondozo@janoskorhaz.hu)



Betegtájékoztató Prick bőrpróba (intraepidermiális allergia bőrpróba) vizsgálatról

Önnél allergiás légúti betegség gyanúja miatt (asthma bronchiale, allergiás rhinitis) Prick bőrpróba elvégzését javasolta kezelőorvosa. Jelen vizsgálattal az alábbi allergénekre adott reakcióját szeretnénk meghatározni: **fa-** (nyírfa, mogyoró, juhar, bükk, éger), **fűkeverék** (réti perje, réti csenkesz, csomós ebír, angol perje, réti komócsin)-, **parlagfű** (nagy- és alacsony növésű)-, **feketeüröm** pollenek, **kutya-, macskaszőr, toll keverék** (csirke, liba), **házipor, penészgomba** (Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger), **gomba keverék** (Alternaria alternata, Haetomium olivaceum, Cladosporium, Helminthosporium sativum). Negatív és pozitív (hisztamin) kontroll is szükséges.

A Prick bőrpróba során a bőr hízósejtjeinek IgE típusú ellenanyagokkal való érintettségét mutatjuk ki. A bőrpróbák előnye, hogy azonnal az orvos kezébe van a vizsgálati eredmény, hiszen 15 perc alatt kialakul a korai típusú bőrreakció az adott antigénre. Kérjük, hogy előzetesen szedett gyógyszereiről (antihisztamin, szteroid) a vizsgálatot végző orvost tájékoztassa, mert ezek a vizsgálat eredményét befolyásolhatják.

A vizsgálat menete: az alkar felületének alkohollal történő letisztítása után a tesztelni kívánt allergén kivonat 1-1 cseppjét a felhámra helyezünk, majd steril tűvel 1-2 milliméternyi mélyen a bőrbe juttatjuk. A Prick bőrpróba során 15-30 perc után kell a duzzadt és bepirosodott területek átmérőit meghatározni.

A tevékenység szövődménye lehet: fokozott túlérzékenységi reakció, bőrgyulladás és nagyon ritkán, vérnyomás eséssel járó, több szervet érintő túlérzékenységi reakció. A szövődmények ritkák, és ellátás után az esetek igen nagy részében nem hagynak maradandó károsodást.

Kérjük jelezze, ha korábban már végeztek Önnél Prick tesztet, és az bármilyen szövődménnyel járt!

A tájékoztatót megértettem: (aláírás)

Beleegyző nyilatkozat Prick bőrpróba vizsgálatba:

Alulírott(név)(szül.idő) kijelentem és aláírással megerősítem, hogy allergiás betegség gyanúja miatt szükségessé váló Prick bőrpróba beleegyzem.

A beavatkozás szükségességéről, kivitelezéséről, esetleges szövődményeiről és következményeiről írásban és szóban részletes tájékoztatást kaptam. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam.



Észak-Közép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
I-XII. ker. Tüdőgondozó Intézet és Szűrőállomás
Intézetvezető: Dr. Vasas Szilvia főorvos
1122. Budapest, Pethényi köz 1.
Telefon: 355-8322, Internet: www.janoskorhaz.hu
[email: tudogondozo@janoskorhaz.hu](mailto:tudogondozo@janoskorhaz.hu)



Elismerem, hogy beleegyezésemet kellő megfontolás után, a tájékoztatás megértése alapján minden kényszerszertől mentesen adom.

..... (aláírás, dátum)

Prick bőrpróba eredménye:
Allergén reakció

Juhar+bükk R44	
Nyír+éger R60	
Mogyoró keverék R59	
Fűfélék 5 R38	
Parlagfű keverék R43	
Feketeüröm SPT 532	
Kutyaszőr SPT 48	
Macskaszőr SPT 49	
Toll keverék RSR 6	
Dermatophagoides mix R99	
Gomba keverék RSR 37	
Aspergillimix R32	
Pozitív kontroll SPT 420	
Negatív kontroll SPT 420	
A	

.....
Orvos aláírás, dátum, pecsét