

A vizsgálat célja: A vizsgálat lehetővé teszi a nyelőcső, a gyomor és a nyombél nyálkahártyáján kialakult betegségek, rendellenességek felismerését. Gyulladások, fekélyek, polypok, gastrooesophagealis reflux betegség, coelika fennállásának lehetősége, jóindulatú és rosszindulatúság gyanúját keltő daganatok, vérzés esetén a diagnózis pontos felállítását, illetve kontroll vizsgálat esetén az alapbetegség gyógyulásának az ellenőrzését teszi lehetővé. A megtekintés mellett szövettani mintavétel is történik a legtöbb alkalommal. (biopsia). Endoscopos gyógykezelés (pl. vérzéscsillapítás, idegentest kivétel, polyp eltávolítás) is szükségessé teheti ezt a beavatkozást.

A vizsgálat előkészítése: A vizsgálat éhgyomorra történik, előtte legalább 6 órával nem lehet étkezni, illetve a beavatkozás előtt 2 órával iható utoljára víztiszta folyadék. Szükség esetén egyes gyógyszereket (pl. PPI, vérhígítók) el kell hagynia a vizsgálat előtti megjelölt időszakban.

A vizsgálat menete: Gyermekeknél a vizsgálat altatásban történik. Vizsgálatok általában reggel 9 órakor kezdődnek. A vizsgálat időtartama általában 10-15 perc. A vizsgálat során vett mintákat és polipokat szövettani feldolgozásra küldjük.

A beavatkozás előnyei:

- Ha a nyelőcső, gyomor, nyombél, megtekintése lehetővé válik, akkor az ott jelentkező betegségek felderíthetőek, szükség szerint kezelhetőek.
- Rövid idő alatt pontos diagnózis állítható fel.
- Szövettani mintavétellel a betegség rövid időn belül azonosítható.
- Endoszkópos gyógykezelésre is lehetőség van (pl: vérzéscsillapítás, polip eltávolítás, idegentest kivétel).

Alternatívák ismertetése: Az esetek többségében nincs alternatív eljárás. Egyes esetekben szóba jön: röntgen, hasi ultrahang, CT vagy MRI vizsgálat, melyek azonban a gyomortükrözéssel nem egyenértékűek.

A beavatkozás kockázata, szövődményei:

- Érzéstelenítőszer vagy nyugtató injekció iránti túlérzékenységi reakció, bőrpír vagy vénagyulladás
- Beavatkozással kapcsolatosan vérzés vagy perforáció (átfúródás) alakulhat ki.
- Epilepsziás roham vagy szívritmuszavar következhet be.
- A tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt (10000 vizsgálatból átlagosan 1 esetben) sürgős műtét válhat szükségessé. Az esetleges szövődmények ellátására Intézményünk felkészült, az esetleges szövődményeket a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.

A beavatkozás elmaradásának lehetséges előnyei:

A beavatkozás elmaradásának nincs előnye.

A beavatkozás elmaradásának lehetséges kockázata, szövődményei: Bizonyos elváltozások, mint például a gyulladáisos, fekélyes betegségek, daganatok diagnosztizálásának legbiztosabb módszere a tükrözéses vizsgálat. Halogatása kockázatos lehet.

Tanácsok a vizsgálatot követő időszakra:

- Beavatkozás után csak az egészségügyi személyzet engedélye után lehet inni, illetve táplálkozni
- Amennyiben a vizsgálat után szokatlan panasz vagy tünet jelentkezne, forduljon vizsgáló orvosához, illetve a vizsgálatot végző osztályhoz.
- Szükséges lehet diétára vonatkozó javaslat, életmódbeli tanácsadás, melyet személyre szabott szóbeli tájékoztatás formájában biztosítunk.

Az esetek többségében a beteget aznap otthonába bocsátjuk.

Szövettani eredményét vizsgáló orvosával fogja megbeszélni.

A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok:

.....
.....

Beleegyezés

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálattal kapcsolatos, írásbeli tájékoztatóban nem szereplő kérdéseimre a szóbeli tájékoztatást megkaptam, további kérdéseim nincsenek. Tudomásul veszem, hogy a vizsgálat szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, az előzőekben nem említett szövődmények, amelyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják. Kérem a vizsgálat elvégzését.

Dátum

Aláírás