



Észak-budai Szent János Centrumkórház
010610502 Gyermekgyógyászati Osztály
Vezető főorvos: Dr. Tory Vera
1125 Budapest, Diós árok 1-3
Telefon: (36-1) 458-4500; (36-1) 458-4522
Internet: www.janoskorhaz.hu

GYERM-PIC II.- 06

**NASOGASTRICUS SZONDA LEHELVEZÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS
A BETEG NYILATKOZATA**

Név:	TAJ:
Születési dátum:	Betegség:
Lakcím:	

Tájékoztatást adó orvos neve:.....

Tisztelt Hozzá tartozó/ Törvényes képviselő!

A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, az Ön beleegyezése szükséges. Felelősségteljes döntéséhez megfelelő ismeretek szükségesek, emiatt tájékoztatjuk a tervezett beavatkozás módjáról, következményeiről, a kezelés elmaradásának veszélyeiről, illetve a kezelés során esetlegesen jelentkező szövődményekről.

1. A TERVEZETT BEAVATKOZÁS: NASOGASTRICUS SZONDA LEHELVEZÉSE

indikációja (javallata):

Gyermekeinek kezelőorvosa a gyermekének érdekében gyomorszonda behelyezését tartja indokoltnak. Nasogastricus vagy gyomorszonda (diagnosztikus, terápiás és tápláló): az orron keresztül a gyomorba vezetett vékony műanyag cső, mely a gyomortartalom leszívására és tápfolyadék bevitelére szolgál. Ez az eljárás mindennapos akut beavatkozás a sürgősségi ellátásban és a különböző kórházi (belgyógyászati, gasztroenterológiai, sebészeti, geriátriai, gyermekgyógyászati stb.) osztályokon. A gyomor kiürülésének nehezítettsége miatt kialakuló gyomorfeszülés, hányinger, hányás esetén

- Felső tápcsatornai vérzés esetén
- Ha a gyomortartalom eltávolítására van szükség (pl. gyógyszermérgezés)
- Ha a beteg táplálása szájon át nem megoldható (pl. nyelési zavar esetén).

rövid leírása: A beavatkozás során, az orrnyíláson keresztül egy kb. 0,5 cm vastagságú hajlékony műanyag csövet vezetnek a nyelőcsőn át a gyomorba. A szonda megfelelő helyzetének elérését követően a külső részét egy gézcsík segítségével a beteg fejéhez rögzítik. A szondán keresztül a gyomorból annak tartalma eltávolítható, a gyomor ezzel tehermentesíthető, ill. lehetővé válik annak átöblítése, szükség esetén gyógyszer tartalmú folyadékkal.

A szondán át gyógyszerek és táplálék juttatható a gyomorba.



Észak-budai Szent János Centrumkórház
010610502 Gyermekgyógyászati Osztály
Vezető főorvos: Dr. Tory Vera
1125 Budapest, Diós árok 1-3
Telefon: (36-1) 458-4500; (36-1) 458-4522
Internet: www.janoskorhaz.hu

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja:

Gyomorürülési zavar esetén (amikor a bélműködés nem megfelelő, például bélelzáródás alakul ki, vagy a gyomor kijáratában szűkületet okozó daganat/gyulladás van) a gyomor folyadékkal, béltartalommal telik meg. Ez intenzív és nagyon kellemetlen hányást provokál. Intenzív hányást okoz a felső tápcsatornai masszív vérzés is. A gyomor feszülése és a társuló hányás rossz közérzetet okoz, fekvőhelyzetben a hányadék belégzésének kockázatával jár. Emiatt előnyös, ha a gyomorban lévő folyadékot/vért kivezetjük, leengedjük, ami a feszülő érzés okozta kellemetlenséget és a hányást is megszünteti. Nyelni nem képes beteg esetén a szondán át a gyógyszerek bejuttatása, a beteg táplálása, itatása is megoldható.

3. A tervezett beavatkozás során vagy azt követően előforduló lehetséges (nem feltétlen kialakuló) szövődmények:

Hangsúlyozandó, az egyes szövődmények megjelenése és azok súlyossága is változó lehet. Ezért a lehetséges kockázat meghatározása minden esetben az adott fejlettségi mérték figyelembevételével fog megtörténni. A szonda levezetése során orrvérzés jelentkezhet. Ez általában spontán szűnik. Előfordulhat, hogy a szonda nem a nyelőcsőbe, hanem a légcsőbe jut. Ez azonnal észlelhető, mert intenzív köhögést provokál. Tartósan alkalmazott gyomorszonda, különösen súlyos állapotú betegekben a nyálkahártya tartós nyomása következtében nyálkahártyavérzést provokálhat, ami általában nem súlyos.

4. Alternatívák ismertetése:

Táplálás céljából vénán keresztül (parenterális) táplálás, PEG készítése jöhet szóba. Használjuk még a nasojejunális szondát is, ami vékonyabb, puhább szonda, de nem a gyomorban, hanem mélyebben, a vékonybélben végződik. Ennek levezetése hosszadalmasabb, endoszkóppal, vagy röntgen képerősítő alatt történik. A gyomortartalom kiürítésére gyomormosás jön szóba, ez azonban jelentősen vastagabb csővel szájon keresztül történik, és elsősorban akut, mérgezéses esetekben alkalmazzák.

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következményei:

Amennyiben a gyomorszonda szükséges esetben nem kerül behelyezésre, a hányás során a hányadék a légutakba kerülve tüdőgyulladást okozhat. A tartós hányás a beteget kimeríti, ionvesztiséget okozhat, illetve erőltetett hányás során megrepedhet a nyálkahártya a gyomor-nyelőcső átmenetben, ami miatt vérzés alakulhat ki. Amennyiben a szonda lehelyezés célja a beteg táplálása, annak elmaradása - az elégtelen táplálékbevitel miatt - a gyógyulási folyamatok lassulását eredményezheti.



Észak-budai Szent János Centrumkórház
010610502 Gyermekgyógyászati Osztály
Vezető főorvos: Dr. Tory Vera
1125 Budapest, Diós árok 1-3
Telefon: (36-1) 458-4500; (36-1) 458-4522
Internet: www.janoskorhaz.hu

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:

Sikeres szondalevezetést követően - a levezetés céljától függően – a gyomortartalom ürülése megindul. Ezt egy műanyag zsákba vezetik. Szükség esetén a gyomor átöblíthető. Amennyiben a szondalehelyezés célja a táplálás biztosítása, speciális tápszerrel ez azonnal elkezdhető.

A szondára az állapot rendeződéséig van szükség. Ez lehet 1-2 nap, vagy hosszabb idő is.

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartama:

A szonda eltávolítására azonnal sor kerül, amint pl. a gyomorürülési akadály megoldódik. Amennyiben műtét válik szükségessé, annak jellege határozza meg, hogy a szonda mikor távolítható el. Táplálás céljából ideiglenesen használunk gyomorszondát. Amennyiben tartós megoldásra van szükség, általában percutan endoscopos gastrostoma (PEG) behelyezését javasoljuk, aminek használata a beteg számára sokkal kényelmesebb.

A szonda levezetése után a beteget a szükséges ideig fekvőbeteg intézményben kezelik tovább. Gyomor szondával csak ritkán kerül a beteg hazabocsátásra.

8. A beteg és hozzátartozója által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok

.....

.....

.....



Észak-budai Szent János Centrumkórház
010610502 Gyermekgyógyászati Osztály
Vezető főorvos: Dr. Tory Vera
1125 Budapest, Diós árok 1-3
Telefon: (36-1) 458-4500; (36-1) 458-4522
Internet: www.janoskorhaz.hu

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Elismerem, hogy részletes, egyéniesített szóbeli tájékoztatást/ felvilágosítást kaptam gyermekem: egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a tervezett beavatkozás lehetséges szövődményeiről, a további ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, kérdéseimre megfelelő válaszokat kaptam.

A megajánlott beavatkozás: **NASOGSTRICUS SZONDALEHELYEZÉSE**

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, amely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszerszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom. A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve kiterjesztésével.

Megértettem és tudomásul veszem, hogy gyermekem kivizsgálása és a kezelése során tanuló nővérek és orvostanhallgatók is részt vesznek. A szükséges EESZT dokumentációba történő betekintést az orvos számára engedélyezem.

A tájékoztatást/felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

A tájékoztatás/felvilágosítás dátuma:

A beavatkozás tervezett dátuma:

A tájékoztatást adó orvos aláírása és pecsétje A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

Budapest, év hó nap óra perc

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos részletes tájékoztatása/felvilágosítása — mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményekre is kitért — ellenére a beavatkozás elvégzését gyermekemnél elutasítom. Ez esetben a gyermekem kezelése során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem, amelyet egyúttal kiterjesztek az ellátó Intézményre is.

A kezelőorvos aláírása, pecsétje A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása
Budapest, év hó nap óra perc